



## ANEXO 8

---

### FAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

Tabela 1. Ictiofauna da Reserva Natural das Águas.

TÁXONS ICTIOFAUNA	NOME COMUM
<b>Família Auchenipteridae</b>	
<i>Glanidium</i> sp.	---
<b>Família Callichthyidae</b>	
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	tambuatá
<i>Corydoras barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	coridora-barbudo
<i>Corydoras macropterus</i> (Regan, 1913)	coridora-vela
<b>Família Centropomidae</b>	
<i>Centropomus parallelus</i> (Poey, 1860)	robalo
<b>Família Characidae</b>	
<i>Astyanax</i> sp.	---
<i>Bryconamericus microcephalus</i> (A. Miranda-Ribeiro, 1908)	lambari
<i>Hollandichthys multifasciatus</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	piabinha
<i>Hyphessobrycon griemi</i> (Hoedeman, 1957)	lambarizinho
<i>Mimagoniates lateralis</i> (Nichols, 1913)	---
<i>Oligosarcus hepsetus</i> (Cuvier, 1817)	dentudo, saicanga
<b>Família Cichlidae</b>	
<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	cará
<i>Cichlasoma facetum</i> (Jenyns, 1842)	acará-camaleão
<i>Crenicichla</i> sp.	---
<b>Família Crenuchidae</b>	
<i>Characidium</i> sp.	---
<b>Família Erythrinidae</b>	
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra, taraíra, tararira
<b>Família Gobiidae</b>	
<i>Awaous tajasica</i> (Lichtenstein, 1822)	gobi-de-rio, amoré-guaçu
<b>Família Gymnotidae</b>	
<i>Gymnotus carapo</i> (Linnaeus, 1758)	carapó, sarapó, carapó-tuvira
<b>Família Heptapteridae</b>	
<i>Acentronichthys</i> sp.	---
<i>Chasmocranus truncatorostris</i> (Borodin, 1927)	bagrinho
<i>Pimelodella transitoria</i> (Ribeiro, 1905)	mandi, mandi-tinga
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	bagre, jundiá, jandiá
<b>Família Loricariidae</b>	
<i>Ancistrus</i> sp.	---
<i>Hemipsilichthys</i> sp.	---
<i>Kronichthys subteres</i> (Ribeiro, 1911)	bagre
<i>Microlepidogaster leucofrenatus</i> (Ribeiro, 1908)	---
<i>Otothyris juquiae</i> (Garavello, Britski & Schaefer, 1998)	---
<i>Pareiorhina</i> sp.	---
<i>Pseudotothyris obtusa</i> (Ribeiro, 1911)	cascludinho
<i>Rineloricaria</i> sp.	---
<i>Rineloricaria</i> sp.	---
<i>Schizolecis guntheri</i> (Miranda Ribeiro, 1918)	cascludinho
<b>Família Poeciliidae</b>	
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	barrigudinho, lebiste, bandeirinha

TÁXONS ICTIOFAUNA	NOME COMUM
<b>Família Pseudopimelodidae</b>	
<i>Microglanis parahybae</i> (Steindachner, 1880)	---
<b>Família Symbranchidae</b>	
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	muçum, peixe-cobra
<b>Família Syngnathidae</b>	
<i>Syngnathus folletti</i> (Herald, 1942)	---
<b>Família Rivulidae</b>	
<i>Rivulus</i> sp.	---
<b>Família Tetragonopterinae</b>	
<i>Deuterodon langei</i> (Travassos, 1957)	lambari
<b>Família Trichomycteridae</b>	
<i>Trichomycterus davisii</i> (Haseman 1911)	candiru

Tabela 2. Anurofauna da Reserva Natural das Águas.

**Legenda - Ambientes flo:** floresta; **aab:** áreas abertas; **aqu:** aquático; **fos:** fossorial; **ter:** terrícola; **arb:** arborícola

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
<b>Família Bufonidae</b>			
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Rhinella gr margaritifera</i> (Laurenti, 1768)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Bufo typhonius</i> (Schneider, 1799)	sapo	flo ter aqu	
<i>Dendrophryniscus brevipollicatus</i> (Jiménez de la Espada, 1871)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i> (Izecksohn, 1968)	sapo	flo aab ter aqu	
<b>Família Centrolenidae</b>			
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	sapinho	flo arb aqu	vulnerável
<b>Família Hylidae</b>			
<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Dendropsophus berthallutzae</i> (Bokermann, 1962)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus werneri</i> (Cochran, 1952)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla arianae</i> (Cruz & Peixoto, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla geographica</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Hypsiboas geographicus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca	flo arb aqu	vulnerável
<i>Phyllomedusa distincta</i> (A. Lutz in B. Lutz, 1950)	perereca-verde	flo arb aqu	
<i>Phrynohyas mesophaea</i> (Hensel, 1867)	perereca-grudenta		
<i>Pseudis minuta</i> (Günther, 1858)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax alter</i> (B. Lutz, 1973)	perereca	flo aqu	
<i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax catharinae</i> (Boulenger, 1888)	perereca	flo arb aqu	

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
<i>Scinax cuspidatus</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax perereca</i> Pombal (Haddad & Kasahara, 1995)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867)	perereca	flo arb aqu	
<b>Família Leiuperidae</b>			
<i>Physalaemus maculiventris</i> (Lutz, 1925)	rãzinha	flo aab ter aqu	
<i>Physalaemus bokermanni</i> (Cardoso & Haddad, 1985)	rãzinha	flo aab ter aqu	
<b>Família Leptodactylidae</b>			
<i>Adenomera bokermanni</i> (Heyer, 1973)	rã	flo ter	
<i>Leptodactylus latrans</i> (=ocellatus) (Steffen, 1815)	rã	flo ter aqu	
<i>Leptodactylus notoaktites</i> (Heyer, 1978)	rã	flo ter aqu	
<b>Família Hylodidae</b>			
<i>Crossodactylus</i> sp.		flo ter aqu	
<i>Hylodes lateristrigatus</i> (Baumann, 1912)		flo ter arb aqu	
<i>Hylodes asper</i> (Müller, 1924)		flo ter arb aqu	
<b>Família Craugastoridae</b>			
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	flo arb aqu	vulnerável
<b>Família Ceratophryidae</b>			
<i>Ceratophrys aurita</i> (Raddi, 1823)	sapo-untanha	flo ter aqu	vulnerável
<b>Família Cycloramphidae</b>			
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i> (Werner, 1897)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus mirandaribeiroi</i> (Heyer, 1983)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus rhyakonastes</i> (Heyer, 1983)	sapo	flo ter aqu	
<b>Família Eleutherodactylidae</b>			
<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-das-matas	flo arb aqu	
<b>Família Microhylidae</b>			
<i>Chiasmocleis leucosticta</i> (Boulenger, 1888)	sapinho	flo ter fos aqu	
<b>Família Ranidae</b>			
<i>Rana catesbiana</i> (Shaw, 1802)	rã-touro	aab ter aqu	exótica

Tabela 3. Reptiliofauna da Reserva Natural das Águas.

**Legenda: Ambientes** - fl: florestas; re: restingas; mn: mangues; ab: áreas abertas; aq: aquático, sendo (It): lótico; (In): lântico; (ma): marinho; **hábitos**: fo: fossorial; sf: semifossorial; ter: terrícola; aq: aquático *sensu stricto*; saq: semi-aquático; sab: semi-arborícola; ab: arborícola. **Status** - fr: frequente; pfr: pouco frequente; rr: raro; am: ameaçado de extinção; in: insuficientemente conhecido.

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
<b>TESTUDINES</b>			
<b>Família Chelidae</b>			
<i>Hydromedusa tectifera</i> (Cope, 1869)	cágado	aq (It)	fr
<b>CROCODYLIA</b>			
<b>Família Alligatoridae</b>			
<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	jacaré-de-papo-amarelo	aq (In, ma) mn	fr am
<b>SQUAMATA – LACERTILIA</b>			

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
<b>Família Polychrotidae</b>			
<i>Enyalius iheringii</i> (Boulenger, 1885)	camaleão	fl	fr
<b>Família Gekkonidae</b>			
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	lagartixa-de-parede	fl re ab	fr
<b>Família Anguidae</b>			
<i>Diploglossus fasciatus</i> (Gray, 1831)	lagarto-coral	fl	pfr
<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1825)	cobra-de-vidro	fl re ab	ra
<b>Família Gymnophthalmidae</b>			
<i>Colobodactylus taunayi</i> (Amaral, 1933)	lagarto	fl re ab	ra
<i>Placosoma glabellum</i> (Peters, 1870)	lagarto	fl re ab	fr
<i>Placosoma cordylinum</i> Tschudi, 1847	lagarto	fl re ab	pfr
<b>Família Teiidae</b>			
<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto, teiú	fl re mn ab	fr
<b>SQUAMATA - AMPHISBAENIA</b>			
<b>Família Amphisbaenidae</b>			
<i>Amphisbaena microcephala</i> (Wagler, 1824)	cobra-cega	fl re ab	fr
<b>SQUAMATA - SERPENTES</b>			
<b>Família Colubridae</b>			
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl re ab	fr
<i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl ab	pfr
<i>Chironius multiventris</i> (Schmidt & Walker, 1943)	cobra-cipó, voadeira	fl re ab	
<i>Chironius laevicollis</i> (Dixon, Wiest & Cei, 1993)	cobra-cipó, voadeira	fl ab	fr
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana	fl re	fr
<b>Família Dipsadidae</b>			
<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	muçurana, bairú	fl	rr am
<i>Dipsas albifrons</i> (Sauvage, 1884)	dormideira	fl	
<i>Dipsas incerta</i> (Jan, 1863)	dormideira	fl	in
<i>Dipsas neivai</i> (Amaral, 1923)	dormideira	fl	in
<i>Dipsas indica</i> (Laurenti, 1768)	dormideira	fl	rr
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	coral-falsa	fl re ab	fr
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825)	cobra-d'água	aq (lt, ln)	fr
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dormideira	fl	rr
<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	fl re mn ab aq (lt, ln, ma)	fr
<i>Oxyrhopus clathratus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	coral-falsa	fl re	fr
<i>Sibynomorphus newwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira	fl re ab	fr
<i>Tomodon dorsatus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	---	fl re	pfr
<i>Uromacerina ricardinii</i> (Peracca, 1897)	cobra-cipó	fl re	pfr
<i>Xenodon newwiedi</i> (Günther, 1863)	jararaca-falsa	fl	fr
<b>Família Elapidae</b>			
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	fl re ab	fr
<b>Família Viperidae</b>			
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924)	jararaca	fl re ab	fr
<i>Bothrops jararacussu</i> (Lacerda, 1884)	jararacuçu	fl re ab	fr

Tabela 4. Avifauna da Reserva Natural das Águas.

**Legenda: Ambiente – fpfm:** formações pioneiras de influência fluviomarinha; **fpf:** formações pioneiras de influência fluvial; **fod:** floresta ombrófila densa primária; **pa:** pastagem; **ca:** capoeira (fase inicial de floresta); **cp:** capoeirão (fase intermediária de floresta); **fs:** floresta secundária ; **aa:** áreas alteradas; **aq:** ambientes aquáticos. **Status – Am:** ameaçada de extinção; **Ra:** rara; **Vu:** vulnerável; **Exo:** exótica; **Ic:** insuficientemente conhecida e possivelmente ameaçado; **Bi:** indicadora de integridade ambiental, para ambientes florestais; **M:** migratória; **Em:** endêmica; **?:** táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência [com base em IBAMA (2003); SICK (1997); BIRDLIFE (2000)]

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<b>ANSERIFORMES</b>			
<b>Família Anatidae</b>			
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	fpfm-fpf	
<b>GALLIFORMES</b>			
<b>Família Cracidae</b>			
<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815 )	jacuguaçu	fod-cp-fs	Am
<b>Família Odontophoridae</b>			
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	fod	
<b>SULIFORMES</b>			
<b>Família Phalacrocoracidae</b>			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	fpf-aq	
<b>PELECANIFORMES</b>			
<b>Família Ardeidae</b>			
<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	socó-grande	fpfm-fpf	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	pa	
<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	fpfm-fpf	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	fpfm-fpf	
<b>ACCIPITRIFORMES</b>			
<b>Família Accipitridae</b>			
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande	fod-ca-cp-fs-aa	Vu
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pega-macaco	fod	
<b>GRUIFORMES</b>			
<b>Família Aramidae</b>			
<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)	carão	fpfm-fpf	
<b>Família Rallidae</b>			
<i>Aramides cajanea</i> (Müller, 1776)	saracuraçu	fpfm-fpf	
<b>CHARADRIIFORMES</b>			
<b>Família Charadriidae</b>			
<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	batuíra-de-coleira	fpfm-fpf-aq	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	fpf	
<b>Família Jacanidae</b>			
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	fpfm-fpf	
<b>APODIFORMES</b>			
<b>Família Apodidae</b>			
<i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862)	taperá-de-barriga-cinza	fod-ca-cp-fs-aa	
<b>Família Trochilidae</b>			
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	fpf-fod-cp-fs	
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	fod-fs-cp	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Thalurania glaucopsis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-fronte-violeta	fpfm-fpf-fod- cp-fs	
<b>CORACIIFORMES</b>			
<b>Família Momotidae</b>			
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	fod-sc	
<b>PICIFORMES</b>			
<b>Família Ramphastidae</b>			
<i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823)	tucano-de-bico-preto	fod-fs	Ra
<b>Família Picidae</b>			
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-velho	fod-cp-sc	
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	pa-ca-aa	
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-da-banda-branca	fod-fs	
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	fod-fs	
<i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845)	picapauzinho	fod-cp-fs	
<b>FALCONIFORMES</b>			
<b>Família Falconidae</b>			
<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	falcão-peregrino	fpfm-fod	? Am, M
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	fod-ca-cp-fs-aa	
<b>PASSERIFORMES</b>			
<b>Família Thamnophilidae</b>			
<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	trovoada-carijó	fod	
<i>Dryophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	fod	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	fod-fs-cp	
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	fod-fs-cp	
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	fod-fs-cp	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-toca-do-sul	fod-fs-cp	
<i>Thamnophilus caeruleus</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata	fod-fs -cp-ca	
<b>Família Conopophagidae</b>			
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente-marrom	fod-fs-cp-ca	
<b>Família Dendrocolaptidae</b>			
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1824	arapaçu-grande	fod-sc	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cabeça-cinza	fod-cp-fs	
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	fod-fs	
<b>Família Furnariidae</b>			
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	fod-sc	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	ca-cp-pa-aa	
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroadado	fod-ca-cp-fs	
<i>Philydor rufus</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-canela	fod-sc	
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)	pichororé	fod-ca-cp-fs	
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miudo	fod-fs	
<b>Família Pipridae</b>			
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará-dançarino	fod-fs-cp-ca	
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-fs	Bi
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-sc	
<b>Família Oxyruncidae</b>			
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	bico-agudo	fod	Bi

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<b>Família Cotingidae</b>			
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	fod	Vu
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-fs	Am, Bi
<b>Família Tyrannidae</b>			
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	cp-ca	
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-óculos	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-verde	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	fod-fs	
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	fod-fs-cp	
<i>Machetornis rixosus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	pa-ca-cp-fs-aa	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	nei-nei	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	abre-asa-de-cabeça-cinza	fod-fs	
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	fod-fs-cp	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	felipe-do-peito-riscado	fs-cp-ca-aa	
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bem-te-vi-de-coroa-vermelha	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1816)	caneleiro-de-chapéu-negro	fod-fs-cp	
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha	fod	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi-verdadeiro	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho-de-garganta-branca	fod-fs	
<i>Ramphotrigon megacephala</i> (Swainson, 1836)	maria-cabeçuda	fod	Ra
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	fod-fs-cp	
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	spit-spit	fod	
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri-tropical	cp-ca-pa-aa	
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesoura	fs-cp-ca-aa	
<b>Família Vireonidae</b>			
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	fod-fs-cp-ca-aa	
<b>Família Corvidae</b>			
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	fod-fs-cp	
<b>Família Hirundinidae</b>			
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	fpfm-fpf-fod-fs-cp-ca-pa-aa	
<b>Família Troglodytidae</b>			
<i>Thryothorus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrincha-açu	fpfm-fpf	
<i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, 1808)	corruíra	cp-ca-pa-aa	
<b>Família Parulidae</b>			
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830)	pula-pula-coroado	fod-fs-cp	
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	fod-fs-cp	



TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	fpf-fod	
<b>Família Icteridae</b>			
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	fpf-fod-fs-cp	
<i>Leistes supercilialis</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	ca-pa-aa	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim-gaudério	ca-pa-aa	
<b>Família Thraupidae</b>			
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	fod	Bi
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-da-mata	fod	
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	fod	
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	fod-fs-cp	
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	gurundi	fod-fs-cp	
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saira-de-lenço	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	sete-cores	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaço-asa-azul	fod	
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	fod-fs-cp	
<b>Família Passeridae</b>			
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal-doméstico	aa	Exo
<b>Família Caprimulgidae</b>			
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788)	tuju	fod-fs	
<b>Família Cathartidae</b>			
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	fod-ca-cp-fs	
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-comum	fod-ca-cp-fs-aa	
<b>Família Coerebidae</b>			
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	fs-cp-ca-aa	
<b>Família Columbidae</b>			
<i>Columba plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	fod-fs	
<i>Columba picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca	fod-ca-cp-sc	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	ca-cp-aa	
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga	fod-cp-sc	
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu	fod-ca-cp-fs	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc	
<b>Família Cuculidae</b>			
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto	ca-pa-aa	
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	ca-pa-aa	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	fod-cp-fs	
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo	cp-ca-pa	
<b>Família Emberizidae</b>			
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-pimenta	fod-	Bi
<i>Saltator similis</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)	trinca-ferro-de-asa-verde	fod-fs-cp	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	pa-ca-cp-aa	
<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1817)	coleirinha	pa-ca-cp-aa	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	tico-tico-verdadeiro	cp-ca-pa-aa	
<b>Família Formicariidae</b>			

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1818)	tovaca-campainha	fod	Bi
<b>Família Muscicapidae</b>			
<b>Subfamília Turdinae</b>			
<i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-preta	fod	
<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-coleira	fod-fs-cp	
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1851	sabiá-poca	fod-fs-cp-ca	
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	fod-fs-cp-ca-aa	
<b>Família Nyctibiidae</b>			
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	fod-fs	
<b>Família Psittacidae</b>			
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883)	tuim-de-asa-azul	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiu-cuiu	fod-fs	Ra, Bi
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	fod-fs	
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mangue	fpfm	Ra
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	galinha-d'água	fpf-aq	
<i>Rallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	fpfm-fpf	
<b>Família Strigidae</b>			
<i>Otus choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	fod-fs-cp	
<b>Família Tinamidae</b>			
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó	fod	
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	fod-cp-fs	Bi
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	cap-cp-fs	
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	fod	
<b>Família Trogonidae</b>			
<i>Trogon rufus</i> (Gmelin, 1758)	surucuá-de-barriga-amarela	fod-cp-sc	
<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucuá-de-peito-azul	fod-cp-fs	
<b>Família Tytonidae</b>			
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	suindara	aa	

Tabela 5. Mastofauna da Reserva Natural das Águas.

**Legenda:** **Ambientes** – **fod**: floresta ombrófila densa; **fodtb**: floresta ombrófila densa de terras baixas; **fodsm**: floresta ombrófila densa submontana; **vs**: vegetação secundária; **vsfs**: vegetação secundária - floresta secundária; **vsc**: vegetação secundária – capoeirão; **vscp**: vegetação secundária – capoeira; **ma**: manguezal; **fpif**: formação pioneira de influência fluvial; **aa**: áreas alteradas; **aq**: ambientes aquáticos. **Status** - **Local**: **Co** – comum; **Pc** – pouco comum; **Ra** – raro. **Ameaça**: **Am** - ameaçado de extinção; **Vu** – vulnerável; **Qa** - quase ameaçada; **Rb** - risco baixo; **Di** - dados insuficientes; **nc** - não consta em lista oficiais; **?** – status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status). **Indicação**: **In** - espécie indicadora; **Ae** - animal especial. Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: Ministério do Meio Ambiente (2008) e IUCN (2008).

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<b>família Didelphidae</b>			
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	gambá	fodtb-fodsm	

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758)	gambá-de-orelha-preta	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Co/nc
<i>Philander frenata</i> (Olfers, 1818)	cuíca -de-quatro-olhos	fodsm	
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	cuíca	fodtb-fodsm-fpif	
<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	guaiquica	fodtb	
<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	fodsm	
<i>Monodelphis scalops</i> (Thomas, 1888)	catita	fodsm	
<b>família Dasypodidae</b>			
<i>Cabassous tatouay</i> (Desmarest, 1804)	tatuí	fodtb-fodsm-vsc ap	
<i>Dasybus novencinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha	fodtb-fodsm-vsc ap-vsc -vsfs	Co
<b>família Myrmecophagidae</b>			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	fodtb-fodsm	Pc/Vu <sup>1</sup> Rb <sup>2</sup> /Ae
<b>Família Phyllostomidae</b>			
<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego	fodsm	
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	morcego	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego	fod	
<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-vampiro	fodtb-vsc -vsfs	
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego	fod	
<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fod	
<i>Platyrrhinus recifinus</i> (Thomas, 1901)	morcego	fod	
<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego	fodsm	
<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fodtb-fodsm	
<i>Vampyressa pusilla</i> (Wagner, 1843)	morcego	fod	
<i>Vampyriscus bidens</i> (Dobson, 1878)	morcego	fod	
<b>Família Molossidae</b>			
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego	fodsm	
<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	morcego	fodsm	
<b>Família Noctilionidae</b>			
<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	fodtb-ma	
<b>família Cebidae</b>			
<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	fodtb-fodsm	Co/nc
<b>família Atelidae</b>			
<i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766)	guariba, bugio	fodsm	Pc/nc
<b>família Canidae</b>			
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato, graxaim	fod-vsc-vscp-vsc - vsfs-ma	Pc/nc
<b>família Felidae</b>			
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Pc/Vu <sup>1</sup>
<i>Leopardus</i> sp.	gato-do-mato	fodtb-fodsm	
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	onça-pintada	fod-vs	Ra/Vu <sup>1</sup> Rb <sup>2</sup> /In/Ae
<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	jaguarundi	fodtb-fodsm-vsc -	Ra/Vu <sup>1</sup>

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda	vsfs fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Co/Rb <sup>2</sup> /Ae
<b>família Mustelidae</b>			
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	fodtb	Pc/Di <sup>2</sup> /In/Ae
<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	ariranha	fodtb	Ra/Vu <sup>1</sup> Am <sup>2</sup> /In/Ae
<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Pc
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	fodtb-fodsm	
<b>família Procyonidae</b>			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	
<i>Procyon cancrivorus</i> (F. Cuvier, 1798)	mão-pelada	fodtb	Pc
<b>família Tayassuidae</b>			
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto	fodtb-fodsm-vsc p- vsc -vsfs	Co/Rb <sup>2</sup> /Ae
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada	fodtb-fodsm-vsc p- vsc -vsfs	Co/nc/In/Ae
<b>família Cervidae</b>			
<i>Mazama</i> sp.	veado n.i.	fodtb-fodsm	Co/Di <sup>2</sup>
<b>família Leporidae</b>			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Co/Vu <sup>2</sup> /In/Ae
<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	lebre européia	fod-vs	exótica
<b>família Sciuridae</b>			
<i>Sciurus</i> sp.	serelepe	fodtb-vsc -vsfs	
<b>família Hydrochaeridae</b>			
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	fodtb	Co
<b>família Dasyproctidae</b>			
<i>Dasyprocta azarae</i> (Lichtenstein, 1823)	cutia	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Co/Di <sup>2</sup>
<b>família Cuniculidae</b>			
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	fodtb-fodsm-vsc - vsfs	Co
<b>família Caviidae</b>			
<i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777)	preá	fodtb	Pc/nc
<b>família Eretizontidae</b>			
<i>Coendou</i> sp.	ouriço, porco- espinho	fodtb-fodsm	Co
<b>família Cricetidae</b>			
<i>Akodon</i> spp.	rato-silvestre	fod-vs	
<i>Thomomys</i> spp.	rato-silvestre	fod	
<i>Oryzomys</i> spp.	rato-silvestre	fod-vs	
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	Rato-d'água	fpif-aq	
<i>Hesperomys leucodactylus</i> (Tschudi, 1845)	rato-silvestre	fod	
<i>Thaptomys</i> spp.	rato-silvestre	fod	
<b>família Echimyidae</b>			

---

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Trinomys iheringi</i> (Thomas, 1911)	rato-silvestre	fod	
<i>Proechimys</i> sp.	rato-de-espinho	fodsm	