

RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

Plano de Manejo

RPPN MORRO DA MINA / RPPN SANTA MARIA
Antonina/PR - Dezembro 2024

ANEXO 3

Levantamento da Fauna



TABELA 1. ICTIOFAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS
(Lista atualizada em 2024)

TÁXONS ICTIOFAUNA	NOME COMUM
FAMÍLIA AUCHENIPTERIDAE	
<i>Glanidium sp.</i>	---
FAMÍLIA CALLICHTHYIDAE	
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	tambuatá
<i>Corydoras barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	coridora-barbudo
<i>Corydoras macropterus</i> (Regan, 1913)	coridora-vela
FAMÍLIA CENTROPOMIDAE	
<i>Centropomus parallelus</i> (Poey, 1860)	robalo
FAMÍLIA CHARACIDAE	
<i>Astyanax sp.</i>	---
<i>Bryconamericus microcephalus</i> (A. Miranda-Ribeiro, 1908)	lambari
<i>Hollandichthys multifasciatus</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	piabinha
<i>Hyphessobrycon griemi</i> (Hoedeman, 1957)	lambarizinho
<i>Mimagoniates lateralis</i> (Nichols, 1913)	---
<i>Oligosarcus hepsetus</i> (Cuvier, 1817)	dentudo, saicanga
FAMÍLIA CICHLIDAE	
<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	cará
<i>Cichlasoma facetum</i> (Jenyns, 1842)	acará-camaleão
<i>Crenicichla sp.</i>	---
FAMÍLIA CRENUCHIDAE	
<i>Characidium sp.</i>	---
FAMÍLIA ERYTHRINIDAE	
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra, taraíra, tararira
FAMÍLIA GOBIIDAE	
<i>Awaous tajasica</i> (Lichtenstein, 1822)	gobi-de-rio, amoré-guaçu
FAMÍLIA GYMNOTIDAE	
<i>Gymnotus carapo</i> (Linnaeus, 1758)	carapó, sarapó, carapó-tuvira
FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE	
<i>Acentronichthys sp.</i>	---
<i>Chasmocranus truncatorostris</i> (Borodin, 1927)	bagrinho
<i>Pimelodella transitoria</i> (Ribeiro, 1905)	mandi, mandi-tinga
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	bagre, jundiá, jandiá
FAMÍLIA LORICARIIDAE	
<i>Ancistrus sp.</i>	---
<i>Hemipsilichthys sp.</i>	---
<i>Kronichthys subteres</i> (Ribeiro, 1911)	bagre
<i>Microlepidogaster leucofrenatus</i> (Ribeiro, 1908)	---

TÁXONS ICTIOFAUNA	NOME COMUM
<i>Otothyris juquiae</i> (Garavello, Britski & Schaefer, 1998)	---
<i>Pareiorhina</i> sp.	---
<i>Pseudotothyris obtusa</i> (Ribeiro, 1911)	cascudinho
<i>Rineloricaria</i> sp.	---
<i>Rineloricaria</i> sp.	---
<i>Schizolecis guntheri</i> (Miranda Ribeiro, 1918)	cascudinho
FAMÍLIA POECILIIDAE	
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868)	barrigudinho, lebiste, bandeirinha
FAMÍLIA PSEUDOPIMELODIDAE	
<i>Microglanis parahybae</i> (Steindachner, 1880)	---
FAMÍLIA SYMBRANCHIDAE	
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	muçum, peixe-cobra
FAMÍLIA SYNGNATHIDAE	
<i>Syngnathus folletti</i> (Herald, 1942)	---
FAMÍLIA RIVULIDAE	
<i>Rivulus</i> sp.	---
FAMÍLIA TETRAGONOPTERINAE	
<i>Deuterodon langei</i> (Travassos, 1957)	lambari
FAMÍLIA TRICHOMYCTERIDAE	
<i>Trichomycterus davisii</i> (Haseman 1911)	candiru

TABELA 2. ANUROFAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

LEGENDA

AMBIENTE: flo → floresta aab → áreas abertas aqu → aquático fos → fossorial ter → terrícola arb → arbórea

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
FAMÍLIA BUFONIDAE			
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Rhinella gr margaritifera</i> (Laurenti, 1768)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Bufo typhonius</i> (Schneider, 1799)	sapo	flo ter aqu	
<i>Dendrophryniscus brevipollicatus</i> (Jiménez de la Espada, 1871)	sapo	flo aab ter aqu	
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i> (Izecksohn, 1968)	sapo	flo aab ter aqu	
FAMÍLIA CENTROLINIDAE			
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	sapinho	flo arb aqu	vulnerável
FAMÍLIA HYLIDAE			
<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
<i>Dendropsophus werneri</i> (Cochran, 1952)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla arianæ</i> (Cruz & Peixoto, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla geographica</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Hypsiboas geographicus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca	flo arb aqu	vulnerável
<i>Phyllomedusa distincta</i> (A. Lutz in B. Lutz, 1950)	perereca-verde	flo arb aqu	
<i>Phrynohyas mesophaea</i> (Hensel, 1867)	perereca-grudenta		
<i>Pseudis minuta</i> (Günther, 1858)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax alter</i> (B. Lutz, 1973)	perereca	flo aqu	
<i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax catharinae</i> (Boulenger, 1888)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax cuspidatus</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax perereca</i> Pombal (Haddad & Kasahara, 1995)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867)	perereca	flo arb aqu	
FAMÍLIA LEIUPERIDAE			
<i>Physalaemus maculiventris</i> (Lutz, 1925)	rãzinha	flo aab ter aqu	
<i>Physalaemus bokermanni</i> (Cardoso & Haddad, 1985)	rãzinha	flo aab ter aqu	
FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE			
<i>Adenomera bokermanni</i> (Heyer, 1973)	rã	flo ter	
<i>Leptodactylus latrans</i> (=ocellatus) (Steffen, 1815)	rã	flo ter aqu	
<i>Leptodactylus notoaktites</i> (Heyer, 1978)	rã	flo ter aqu	
FAMÍLIA HYLODIDAE			
<i>Crossodactylus</i> sp.		flo ter aqu	
<i>Hylodes lateristrigatus</i> (Baumann, 1912)		flo ter arb aqu	
<i>Hylodes asper</i> (Müller, 1924)		flo ter arb aqu	
FAMÍLIA CRAUGASTORIDAE			
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	flo arb aqu	vulnerável
FAMÍLIA CERATOPHYRIDAE			
<i>Ceratophrys aurita</i> (Raddi, 1823)	sapo-untanha	flo ter aqu	vulnerável
FAMÍLIA CYCLORAMPHIDAE			
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i> (Werner, 1897)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus mirandaribeiroi</i> (Heyer, 1983)	sapo	flo ter aqu	
<i>Cycloramphus rhyakonastes</i> (Heyer, 1983)	sapo	flo ter aqu	
FAMÍLIA ELEUTHERODACTYLIDAE			
<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-das-matas	flo arb aqu	

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
FAMÍLIA MICROHYLIDAE			
<i>Chiasmocleis leucosticta</i> (Boulenger, 1888)	sapinho	flo ter fos aqu	
FAMÍLIA RANIDAE			
<i>Rana catesbiana</i> (Shaw, 1802)	rã-touro	aab ter aqu	exótica

TABELA 3. REPTILIOFAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

LEGENDA

AMBIENTES: **flo** → floresta **re** → restingas **mn** → mangues **ab** → áreas abertas
aq (aquático) → (lt)lótico / (ln)lêntico / (ma)marinho

HÁBITOS: **fo** → fossorial **sf** → semifossorial **ter** → terrícola **aq** → aquático sensu stricto **saq** → semi-aquático
sab → semi-arborícola **ab** → arborícola

STATUS: **fr** → frequente **pfr** → pouco frequente **rr** → raro **am** → ameaçado de extinção
in → insuficientemente conhecido

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
TESTUDINES			
FAMÍLIA CHELIDAE			
<i>Hydromedusa tectifera</i> (Cope, 1869)	cágado	aq (lt)	fr
CROCODYLIA			
FAMÍLIA ALLIGATORIDAE			
<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	jacaré-de-papo-amarelo	aq (ln, ma) mn	fr am
SQUAMATA – LACERTILIA			
FAMÍLIA POLYCHROTIDAE			
<i>Enyalius iheringii</i> (Boulenger, 1885)	camaleão	fl	fr
FAMÍLIA GEKKONIDAE			
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnès, 1818)	lagartixa-de-parede	fl re ab	fr
FAMÍLIA ANGUIDAE			
<i>Diploglossus fasciatus</i> (Gray, 1831)	lagarto-coral	fl	pfr
<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1825)	cobra-de-vidro	fl re ab	ra
FAMÍLIA GYMNOPTHALMIDAE			
<i>Colobodactylus taunayi</i> (Amaral, 1933)	lagarto	fl re ab	ra
<i>Placosoma glabellum</i> (Peters, 1870)	lagarto	fl re ab	fr
<i>Placosoma cordylinum</i> Tschudi, 1847	lagarto	fl re ab	pfr
FAMÍLIA TEIIDAE			
<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto, teiú	fl re mn ab	fr
SQUAMATA - AMPHISBAENIA			
FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE			
<i>Amphisbaena microcephala</i> (Wagler, 1824)	cobra-cega	fl re ab	fr

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
SQUAMATA - SERPENTES			
FAMÍLIA COLUBRIDAE			
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl re ab	fr
<i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl ab	pfr
<i>Chironius multiventris</i> (Schmidt & Walker, 1943)	cobra-cipó, voadeira	fl re ab	
<i>Chironius laevicollis</i> (Dixon, Wiest & Cei, 1993)	cobra-cipó, voadeira	fl ab	fr
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana	fl re	fr
FAMÍLIA DIPSADIDAE			
<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	muçurana, bairú	fl	rr am
<i>Dipsas albifrons</i> (Sauvage, 1884)	dormideira	fl	
<i>Dipsas incerta</i> (Jan, 1863)	dormideira	fl	in
<i>Dipsas neivai</i> (Amaral, 1923)	dormideira	fl	in
<i>Dipsas indica</i> (Laurenti, 1768)	dormideira	fl	rr
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	coral-falsa	fl re ab	fr
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825)	cobra-d'água	aq (lt, ln)	fr
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dormideira	fl	rr
<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	fl re mn ab aq (lt, ln, ma)	fr
<i>Oxyrhopus clathratus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	coral-falsa	fl re	fr
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira	fl re ab	fr
<i>Tomodon dorsatus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	---	fl re	pfr
<i>Uromacerina ricardinii</i> (Peracca, 1897)	cobra-cipó	fl re	pfr
<i>Xenodon neuwiedi</i> (Günther, 1863)	jararaca-falsa	fl	fr
FAMÍLIA ELAPIDAE			
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	fl re ab	fr
FAMÍLIA VIPERIDAE			
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924)	jararaca	fl re ab	fr
<i>Bothrops jararacussu</i> (Lacerda, 1884)	jararacuçu	fl re ab	fr

TABELA 4. AVIFAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS**LEGENDA**

AMBIENTES: **fpfm** → formações pioneiras de influência fluviomarinha **fpf** → formações pioneiras de influência fluvial
fod → floresta ombrófila densa primária **pa** → pastagem **ca** → capoeira (fase inicial de floresta)
fs → floresta secundária **cp** → capoeirão (fase intermediária de floresta) **aa** → áreas alteradas
aq → ambientes aquáticos

STATUS: **am** → ameaçada de extinção **ra** → rara **vu** → vulnerável **exo** → exótica **m** → migratória **em** → endêmica
ic → insuficientemente conhecida e possivelmente ameaçado
bi → indicadora de integridade ambiental, para ambientes florestais
? → táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência [com base em IBAMA (2003); SICK (1997); BIRDLIFE (2000)]

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
ANSERIFORMES			
FAMÍLIA ANATIDAE			
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	fpfm-fpf	
GALLIFORMES			
FAMÍLIA CRACIDAE			
<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)	jacuguaçu	fod-cp-fs	Am
FAMÍLIA ODONTOPHORIDAE			
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	fod	
SULIFORMES			
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	fpf-aq	
PELECANIFORMES			
FAMÍLIA ARDEIDAE			
<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	socó-grande	fpfm-fpf	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	pa	
<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	fpfm-fpf	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	fpfm-fpf	
ACCIPITRIFORMES			
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE			
<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-cauda-curta	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande	fod-ca-cp-fs-aa	Vu
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pegamaco	fod	
GRUIFORMES			
FAMÍLIA ARAMIDAE			
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	fpfm-fpf	
FAMÍLIA RALLIDAE			
<i>Aramides cajanea</i> (Müller, 1776)	saracuraçu	fpfm-fpf	
CHARADRIIFORMES			
FAMÍLIA CHARADRIIDAE			
<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	batuíra-de-coleira	fpfm-fpf-aq	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	fpf	
FAMÍLIA JACANIDAE			
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	fpfm-fpf	
APODIFORMES			
FAMÍLIA APODIDAE			
<i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862)	taperá-de-barriga-cinza	fod-ca-cp-fs-aa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA TROCHILIDAE			
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	fpf-fod-cp-fs	
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	fod-fs-cp	
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	fpfm-fpf-fod-cp-fs	
CORACIIFORMES			
FAMÍLIA MOMOTIDAE			
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	fod-sc	
PICIFORMES			
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE			
<i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823)	tucano-de-bico-preto	fod-fs	Ra
FAMÍLIA PICIDAE			
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-velho	fod-cp-sc	
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	pa-ca-aa	
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-da-banda-branca	fod-fs	
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	fod-fs	
<i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845)	picapauzinho	fod-cp-fs	
FALCONIFORMES			
FAMÍLIA FALCONIDAE			
<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	falcão-peregrino	fpfm-fod	? Am, M
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	fod-ca-cp-fs-aa	
PASSERIFORMES			
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE			
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	trovoada-carijó	fod	
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	fod	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	fod-fs-cp	
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	fod-fs-cp	
<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	fod-fs-cp	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	fod-fs-cp	
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata	fod-fs -cp-ca	
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE			
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente-marrom	fod-fs-cp-ca	
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE			
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1824	arapaçu-grande	fod-sc	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cabeça-cinza	fod-cp-fs	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	fod-fs	
FAMÍLIA FURNARIIDAE			
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	fod-sc	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	ca-cp-pa-aa	
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	fod-ca-cp-fs	
<i>Philydor rufus</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-canela	fod-sc	
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)	pichororé	fod-ca-cp-fs	
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miudo	fod-fs	
FAMÍLIA PIPRIDAE			
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará-dançarino	fod-fs-cp-ca	
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-fs	Bi
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-sc	
FAMÍLIA OXYRUNCIDAE			
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	bico-agudo	fod	Bi
FAMÍLIA COTINGIDAE			
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	fod	Vu
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-fs	Am, Bi
FAMÍLIA TYRANNIDAE			
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	cp-ca	
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-óculos	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-verde	fod-fs-cp-ca	
<i>Elaenia spectabilis</i> Pelzeln, 1868	guaracava-grande	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	fod-fs	
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	fod-fs-cp	
<i>Machetornis rixosus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	pa-ca-cp-fs-aa	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	nei-nei	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	abre-asa-de-cabeça-cinza	fod-fs	
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	fod-fs-cp	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	felipe-do-peito-riscado	fs-cp-ca-aa	
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bem-te-vi-de-coroa-vermelha	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1816)	caneleiro-de-chapéu-negro	fod-fs-cp	
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha	fod	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi-verdadeiro	fod-fs-cp-ca-pa	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho-de-garganta-branca	fod-fs	
<i>Ramphotrigon megacephala</i> (Swainson, 1836)	maria-cabeçuda	fod	Ra
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	fod-fs-cp	
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	spit-spit	fod	
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri-tropical	cp-ca-pa-aa	
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesoura	fs-cp-ca-aa	
FAMÍLIA VIREONIDAE			
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	fod-fs-cp-ca-aa	
FAMÍLIA CORVIDAE			
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	fod-fs-cp	
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE			
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	fpfm-fpf-fod-fs-cp-ca-pa-aa	
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE			
<i>Thryothorus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrincha-açu	fpfm-fpf	
<i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, 1808)	corruíra	cp-ca-pa-aa	
FAMÍLIA PARULIDAE			
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830)	pula-pula-coroado	fod-fs-cp	
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	fod-fs-cp	
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	fpf-fod	
FAMÍLIA ICTERIDAE			
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	fpf-fod-fs-cp	
<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	ca-pa-aa	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim-gaudério	ca-pa-aa	
FAMÍLIA THRAUPIDAE			
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	fod	Bi
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-da-mata	fod	
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	fod	
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	fod-fs-cp	
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	gurundi	fod-fs-cp	
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saira-de-lenço	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	sete-cores	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Thraupis cyanoptera</i> (Vieillot, 1817)	sanhaço-asa-azul	fod	
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	fod-fs-cp-ca-aa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	fod-fs-cp	
FAMÍLIA PASSERIDAE			
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal-doméstico	aa	Exo
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE			
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788)	tuju	fod-fs	
FAMÍLIA CATHARTIDAE			
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	fod-ca-cp-fs	
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-comum	fod-ca-cp-fs-aa	
FAMÍLIA COEREVIDAE			
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	fs-cp-ca-aa	
FAMÍLIA COLUMBIDAE			
<i>Columba plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	fod-fs	
<i>Columba picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca	fod-ca-cp-sc	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	ca-cp-aa	
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga	fod-cp-sc	
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu	fod-ca-cp-fs	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc	
FAMÍLIA CUCULIDAE			
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto	ca-pa-aa	
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	ca-pa-aa	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	fod-cp-fs	
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo	cp-ca-pa	
FAMÍLIA EMBERIZIDAE			
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-pimenta	fod-	Bi
<i>Saltator similis</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)	trinca-ferro-de-asa-verde	fod-fs-cp	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	pa-ca-cp-aa	
<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1817)	coleirinha	pa-ca-cp-aa	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	tico-tico-verdadeiro	cp-ca-pa-aa	
FAMÍLIA FORMICARIIDAE			
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1818)	tovaca-campainha	fod	Bi
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE			
Subfamília Turdinae			
<i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-preta	fod	
<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-coleira	fod-fs-cp	
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1851	sabiá-poca	fod-fs-cp-ca	
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	fod-fs-cp-ca-aa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE			
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	fod-fs	
FAMÍLIA PSITTACIDAE			
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883)	tuim-de-asa-azul	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiu-cuiu	fod-fs	Ra, Bi
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	fod-fs	
<i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mangue	fpfm	Ra
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	galinha-d'água	fpf-aq	
<i>Rallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	fpfm-fpf	
FAMÍLIA STRIGIDAE			
<i>Otus choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	fod-fs-cp	
FAMÍLIA TINAMIDAE			
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó	fod	
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	fod-cp-fs	Bi
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	cap-cp-fs	
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	fod	
FAMÍLIA TROGONIDAE			
<i>Trogon rufus</i> (Gmelin, 1758)	surucuá-de-barriga-amarela	fod-cp-sc	
<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucuá-de-peito-azul	fod-cp-fs	
FAMÍLIA TYTONIDAE			
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	suindara	aa	

TABELA 5. MASTOFAUNA DA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

LEGENDA

AMBIENTES: **fod** → floresta ombrófila densa **fodtb** → floresta ombrófila densa de terras baixas **aa** → áreas alteradas
aq → ambientes aquáticos **fodsm** → floresta ombrófila densa submontana **vs** → vegetação secundária
vsfs → vegetação secundária-floresta secundária **vsc** → vegetação secundária-capoeirão **ma** → manguezal
vscp → vegetação secundária-capoeira **fpif** → formação pioneira de influência fluvial

STATUS-LOCAL: **co** → comum **pc** → pouco comum **ra** → raro

AMEAÇA: **Am** → ameaçado de extinção **Vu** → vulnerável **Qa** → quase ameaçada **Rb** → risco baixo
Di → dados insuficientes **nc** → não consta em lista oficiais
? → status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status)

INDICAÇÃO: **In** → espécie indicadora **Ae** → animal especial

Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: Ministério do Meio Ambiente (2008) e IUCN (2008)

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA DIDELPHIDAE			
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	gambá	fodtb-fodsm	
<i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758)	gambá-de-orelha-preta	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/nc
<i>Philander frenata</i> (Olfers, 1818)	cuíca -de-quatro-olhos	fodsm	
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	cuíca	fodtb-fodsm-fpif	
<i>Gracilinanus microtarsus</i> (wagner, 1842)	guaiquica	fodtb	
<i>Monodelphis americana</i> (müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	fodsm	
<i>Monodelphis scalops</i> (thomas, 1888)	catita	fodsm	
FAMÍLIA DASYPODIDAE			
<i>Cabassous tatouay</i> (Desmarest, 1804)	tatuí	fodtb-fodsm-vsc ap	
<i>Dasypus novencinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha	fodtb-fodsm-vsc ap-vsc -vsfs	Co
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	fodtb-fodsm	Pc/Vu ¹ Rb ² /Ae
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE			
<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego	fodsm	
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	morcego	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego	fod	
<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-vampiro	fodtb-vsc -vsfs	
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego	fod	
<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fod	
<i>Platyrrhinus recifinus</i> (Thomas, 1901)	morcego	fod	
<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego	fodsm	
<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fodtb-fodsm	
<i>Vampyressa pusilla</i> (Wagner, 1843)	morcego	fod	
<i>Vampyriscus bidens</i> (Dobson, 1878)	morcego	fod	
FAMÍLIA MOLOSSIDAE			
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	morcego	fodsm	
<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	morcego	fodsm	
FAMÍLIA NOCTILIONIDAE			
<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	fodtb-ma	
FAMÍLIA CEBIDAE			
<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	fodtb-fodsm	Co/nc
FAMÍLIA ATELIDAE			
<i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766)	guariba, bugio	fodsm	Pc/nc

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA CANIDAE			
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato, graxaim	fod-vsc-vscp-vsc -vsfs-ma	Pc/nc
FAMÍLIA FELIDAE			
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Pc/Vu ¹
<i>Leopardus sp.</i>	gato-do-mato	fodtb-fodsm	
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	onça-pintada	fod-vs	Ra/Vu ¹ Rb ² /In/ Ae
<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	jaguarundi	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Ra/Vu ¹
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Rb ² /Ae
FAMÍLIA MUSTELIDAE			
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	fodtb	Pc/Di ² /In/Ae
<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	ariranha	fodtb	Ra/Vu ¹ Am ² /In/ Ae
<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Pc
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	fodtb-fodsm	
FAMÍLIA PROCYONIDAE			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	
<i>Procyon cancrivorus</i> (F. Cuvier, 1798)	mão-pelada	fodtb	Pc
FAMÍLIA TAYASSUIDAE			
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto	fodtb-fodsm-vsc p-vsc -vsfs	Co/Rb ² /Ae
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada	fodtb-fodsm-vsc p-vsc -vsfs	Co/nc/In/Ae
FAMÍLIA CERVIDAE			
<i>Mazama sp.</i>	veado n.i.	fodtb-fodsm	Co/Di ²
FAMÍLIA LEPORIDAE			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Vu ² /In/Ae
<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	lebre européia	fod-vs	exótica
FAMÍLIA SCIURIDAE			
<i>Sciurus sp.</i>	serelepe	fodtb-vsc -vsfs	
FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE			
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	fodtb	Co
FAMÍLIA DASYPROCTIDAE			
<i>Dasypsecta azarae</i> (Lichtenstein, 1823)	cutia	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Di ²
FAMÍLIA CUNICULIDAE			
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA CAVIIDAE			
<i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777)	preá	fodtb	Pc/nc
FAMÍLIA ERETIZONTIDAE			
<i>Coendou</i> sp.	ouriço, porco- espinho	fodtb-fodsm	Co
FAMÍLIA CRICETIDAE			
<i>Akodon</i> spp.	rato-silvestre	fod-vs	
<i>Thomazomys</i> spp.	rato-silvestre	fod	
<i>Oryzomys</i> spp.	rato-silvestre	fod-vs	
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	Rato-d'água	fpif-aq	
<i>Hesperomys leucodactylus</i> (Tschudi, 1845)	rato-silvestre	fod	
<i>Thaptomys</i> spp.	rato-silvestre	fod	
FAMÍLIA ECHIMYIDAE			
<i>Trinomys iheringi</i> (Thomas, 1911)	rato-silvestre	fod	
<i>Proechimys</i> sp.	rato-de-espinho	fodsm	



/SPVSBrasil
www.spvs.org.br

