

RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

Plano de Manejo

RPPN MORRO DA MINA / RPPN SANTA MARIA
Antonina/PR - Dezembro 2024

ANEXO 2

Levantamento Florístico



LEGENDA

HÁBITO: **av** → arbóreo **ab** → arbustivo **hb** → herbáceo **tp** → trepador **hp** → hemiparasita **pa** → parasita**TABELA 1. ESPÉCIES DE FANERÓGAMAS REGISTRADAS NA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS**

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA ACANTHACEAE		
<i>Aphelandra liboniana</i> Linden ex Hook. f.	bálsamo-de-duas-cores	hb
<i>Aphelandra ornata</i> (Nees) Lindau	---	hb
<i>Hygrophila brasiliensis</i> (Spreng.) Lindau	---	hb
<i>Justicia carnea</i> (Lindl.) Nicholson	justícia-rosa, jacobina	hb
<i>Ruellia brevifolia</i> (Polh) C. Excurra	pingo-de-sangue, junta-de-cobra-vermelha	hb
FAMÍLIA AMARANTHACEAE		
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	perna-de-saracura, bredo-d'água	hb
<i>Amaranthus viridis</i> L.	brejo, caruru, amaranto	hb
FAMÍLIA ANACARDIACEAE		
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	aroeira-vermelha	av
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	cupiúva	av
FAMÍLIA ANNONACEAE		
<i>Annona emarginata</i> Schlttdl.	araticum, quarema	av
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	cortiça, embiú	av
<i>Rollinia sericea</i> (R.E. Fries) R.E. Fries	araticum-alvadio	av
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba, cortiça, pandauvuna	av
<i>Xylopia langsdorfianna</i> A. St.-Hil. & Tul.	pimenteira	av
FAMÍLIA APIACEAE		
<i>Apium leptophyllum</i> (DC.) F.Muell.	aipo-chimarrão	hb
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	erva-capitão	hb
FAMÍLIA APOCYNACEAE		
<i>Allamanda schottii</i> L.	alamanda, alamanda-de-flo-pequena	ab
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll.Arg.	peroba-vermelha	av
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	guatambu	av
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll. Arg.	guatambu	av
<i>Condylocarpon isthmicum</i> A. DC.	tênia	tp
<i>Malouetia cestroides</i> (Nees ex Mart.) Müll.Arg.	goerana	av
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	jasmim-cata-vento, cobrina	av
FAMÍLIA AQUIFOLIACEAE		
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	caúna	av
<i>Ilex integerrima</i> Reissek.	caúna	av
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek	caúna	av
<i>Ilex theezans</i> Mart.	caúna	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA ARACEAE		
<i>Anthurium pentaphyllum</i> Kunth	antúrio	ep
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	antúrio-vagabundo	ep
<i>Anthurium</i> spp.	---	ep
<i>Monstera adansonii</i> Schott	costela-de-adão	ep
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	banana-de-bugre, imbé	ep
<i>Philodendron corcovadense</i> Reitz	cipó-preto	ep
<i>Philodendron cordatum</i> (Vell.) Kunth	---	ep
<i>Philodendron crassinervium</i> Lindl.	---	ep
FAMÍLIA ARALIACEAE		
<i>Didymopanax angustissimum</i> March.	mandioqueira	av
<i>Schefflera morototoni</i> Decne. & Planch.	caixeta	av
<i>Oreopanax capitatum</i> Decne. & Planch.	---	ep
FAMÍLIA ARECACEAE		
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	palmeira-brejaúva	av
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	palmeira-indaiá	av
<i>Bactris setosa</i> Mart.	tucum	av
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	av
<i>Geonoma elegans</i> Mart.	---	ab
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	guaricanga-de-folha-larga, rabo-de-peixe	ab
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	guaricana, guaminhova	ab
<i>Syagrus rommanzoffiana</i> Cham.	jerivá	av
FAMÍLIA ARISTOLOCHIACEAE		
<i>Aristolochia trilobata</i> Gomez	cipó-de-cobra, cipó-milhomens-da-praia	tp
FAMÍLIA ASCLEPIADACEAE		
<i>Matelea maritima</i> (Jacq.) Woodson	---	tp
FAMÍLIA ASTERACEAE		
<i>Achyrocline satureioides</i> DC.	losna-do-mato, macela	hb
<i>Adenostemma brasilianum</i> (Pers.) Cass.	cravinho-do-mato	hb
<i>Aecmella</i> cf. <i>oleracea</i>	---	hb
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	mentrasto	hb
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	---	hb
<i>Baccharis myriocephala</i> A. DC.	---	hb
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	carqueja	hb
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	buva	hb
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	erva-botão	hb
<i>Elephantopus mollis</i> H.B.K.	erva-grossa, pé-de-elefante	hb
<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	serralhinha, falsa-serralha	hb
<i>Eupatorium inulaefolium</i> Sims	---	hb
<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	mata-pasto, cambará-falso	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Mikania involucrata</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	---	tp
<i>Mikania trinervis</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Piptocarpha</i> sp1	---	av
<i>Piptocarpha</i> sp2	---	av
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	agrião, arnica	hb
<i>Vernonia beyrichii</i> Less.	---	hb
<i>Vernonia quinqueflora</i> Less.	cambarazinho	tp
<i>Vernonia scorpioides</i> (Lam.) Pers.	cambará-ussu, erva-preá	hb
FAMÍLIA BEGONIACEAE		
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	begônia, azedinha	hb
<i>Begonia radicans</i> Vell.	begônia, azedinha	tp
FAMÍLIA BIGNONIACEAE		
<i>Anemopaegma</i> sp	---	tp
<i>Bignoniaceae</i> 1	---	tp
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	carobinha	av
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) Miers	unha-de-gato	tp
<i>Paragonia pyramidata</i> (L.C.Rich) Bureau	cipó	tp
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	pente-de-macaco	tp
<i>Handroanthus cassinoides</i> DC.	caxeta	av
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	ipê-roxo	av
<i>Handroanthus</i> sp.	---	av
<i>Handroanthus umbellata</i> (Sond.) Sandwith	ipê-amarelo-do-brejo	av
FAMÍLIA BOMBACACEAE		
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) Rob.	embiruçu	av
<i>Spirotheca passifloroides</i> Cuatr.	paineirinha-vermelha	ep
FAMÍLIA BORAGINACEAE		
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	louro-mole	av
<i>Tournefortia</i> sp	---	tp
FAMÍLIA BROMELIACEAE		
<i>Aechmea gamosepala</i> Wittm.	bromélia	ep
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	bromélia	ep
<i>Aechmea organensis</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Aechmea ornata</i> Baker	gravatá	ep
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	---	ep
<i>Annanas comosus</i> (L.) Merril	abacaxi	ep
<i>Bilbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	gravatá, caraguatá	ep
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	gravatá, bananinha-do-mato	hb
<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) E. Leme	bromélia	ep
<i>Neoregelia</i> spp.	ninho-de-passarinho	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Nidularium campoalegrense</i> Tardivo	---	ep
<i>Nidularium innocentii</i> (Mez) Smith	bromélia	ep
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	bromélia	ep
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	cravo-do-mato	ep
<i>Racinaea spiculosa</i> (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm	bromélia	ep
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	cravo-do-mato	ep
<i>Tillandsia usneoides</i> L.	barba-de-pau, barba-de-velho	ep
<i>Vriesea atra</i> Mez	---	ep
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Vriesea drepanocarpa</i> (Baker) Mez	---	ep
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	---	ep
<i>Vriesea flammea</i> L.B.Sm.	bromélia	ep
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez	bromélia	ep
<i>Vriesea gigantea</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea phillipoccoburgii</i> Wawra	bromélia	ep
<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.	bromélia	ep
<i>Vriesea procera</i> (Mart. ex Schult.) Witt.	bromélia	ep
<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morris	bromélia	ep
<i>Vriesea</i> spp.	---	ep
<i>Vriesea vagans</i> (L. B. Sm.) L. B. Sm.	bromélia	ep
FAMÍLIA BURSERACEAE		
<i>Protium kleinii</i> Cuatr.	almécega, almesca	av
FAMÍLIA CACTACEAE		
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	rabo-de-rato	ep
<i>Rhipsalis eliptica</i> Lindb.	cacto-pendente	ep
<i>Rhipsalis floccosa</i> Salm.-Dyck ex Pfeiff.	---	ep
<i>Rhipsalis pachyptera</i> Pfeiff.	comambaia	ep
<i>Rhipsalis rhombea</i> (Salm-Dyck) Pfeiff.	---	ep
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	---	ep
FAMÍLIA CAESALPINIACEAE		
<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne	copaíba, copaúva	av
<i>Schizolobium parahyba</i> Blake	guapuruvu	av
<i>Senna cf. spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	cássia-do-nordeste	av
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby	cássia-multijuga	av
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	abotinha, fedegoso	av
FAMÍLIA CAMPANULACEAE		
<i>Hippobroma longiflora</i> Presl	arrebenta-boi, cega-olho	hb
FAMÍLIA CANNACEAE		
<i>Canna limbata</i> Roscoe	beri-silvestre	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA CECROPIACEAE		
<i>Cecropia glaziovii</i>	embaúba-vermelha	av
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	av
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	embaúba-do-norte	av
FAMÍLIA CELASTRACEAE		
<i>Maytenus schumanniana</i> Loes.	sustento, cuinha	av
FAMÍLIA CHLORANTHACEAE		
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart.	chá-de-bugre, cidreira	av
FAMÍLIA CHRYSOBALANACEAE		
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex A.P. DC.	cinzeiro, ubá, uvá-de-facho	av
FAMÍLIA CLETHRACEAE		
<i>Clethra scabra</i> Pers.	carne-de-vaca, caujuja	av
FAMÍLIA CLUSIACEAE		
<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb.	guanando, olandi	av
<i>Clusia criuva</i> Camb.	criúva, mangue-do-mato, mangue-bravo	av/ep
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacopari	av
FAMÍLIA COMBRETACEAE		
<i>Laguncularia racemosa</i> Gardn.	mangue-branco	av
FAMÍLIA COMMELINACEAE		
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	trapoeraba	hb
<i>Commelina robusta</i> Kunth	---	hb
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	---	hb
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> Mik.	cana-de-macaco, gengibre-azul	hb
<i>Tradescantia</i> sp	---	hb
FAMÍLIA CONVULVACEAE		
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Burl.	corda-de-viola, corriola, jitirana	tp
<i>Jacquemontia blanchetii</i> Moric.	---	tp
FAMÍLIA COSTACEAE		
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-do-brejo, cana-de-macaco-vermelha	hb
FAMÍLIA CUNNONIACEAE		
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl	gramimunha	av
FAMÍLIA CYCLANTHACEAE		
<i>Asplundia</i> sp.	---	ab
FAMÍLIA CYPERACEAE		
<i>Becquerelia muricata</i> Nees	---	hb
<i>Calyptrocarya longifolia</i> Kunth	---	hb
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.	---	hb
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	---	hb
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük.	tiririca	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis montana</i> Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis nana</i> Kunth	---	hb
<i>Eleocharis</i> sp1	---	hb
<i>Fuirena robusta</i> Kunth	---	hb
<i>Rynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	---	hb
<i>Scleria uleana</i> Boeck. ex C.B. Clarke	---	hb
FAMÍLIA DILLENIACEAE		
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	lixerinha, cipó-caboclo, cipó-carijó	tp
<i>Doliocarpus schottianus</i> Eichler	---	tp
FAMÍLIA ELAEocarpaceae		
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato	av
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	sapopema, carrapicheira	av
FAMÍLIA ERICACEAE		
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> Meisn.	mirtilo-brasileiro, groselha-do-brejo	ab
FAMÍLIA ERYTHROXYLACEAE		
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) Schult.	fruta-de-pomba	av
FAMÍLIA EUPHORBIACEAE		
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	tanheiro	av
<i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg.	tapiá	av
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	tanheiro	av
<i>Aparisthium cordatum</i> Baill.	pau-de-facho, pau-sandra	av
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	licurana, lucurana	av
<i>Maprounea brasiliensis</i> A. St.-Hil.	leiteiro, mata-berne	av
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	sobragirana, figueirinha	av
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) M. Johns.	mata-olho	av
<i>Pausandra morisiana</i> (Casar.) Radlk.	almecega-vermelha	av
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	sapateiro, tamanqueira	av
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	quebra-pedra, erva-pombinha, sarandi-branco	hb
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	leiteiro, pau-de-leite	av
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. & Endl.	canemuçu, embirão, peloteira	av
FAMÍLIA FABACEAE		
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) JF.Macbr.	angelim	av
<i>Dahlstedtia pentaphylla</i> (Taub.) Burkart	timbozinho	ab
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	trevinho-do-campo, pega-pega-graúdo	hb
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	pega-pega	hb
<i>Desmodium incanum</i> DC.	pega-pega, mata-pasto, amor-do-campo	hb
<i>Dioclea</i> sp.	estojo-de-luneta	tp
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	eritrina-candelabro, mulungu	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Machaerium hatschbachii</i> Rudd	---	av
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelffeld	bico-de-pato	av
<i>Machaerium minutiflorum</i> Tul.	sapuva	av
<i>Mucuna urens</i> DC.	coronha, olho-de-boi, olho-de-burro	tp
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	cabreúva	av
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harm.	coronheira, olho-de-cabra	av
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	jacarandá-do-litoral	av
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.)	pau-jacaré	av
<i>Pterocarpus violaceus</i> Vogel	pau-de-sangue, sangueiro	av
<i>Vigna longifolia</i> (Benth.) Verdc.	---	tp
<i>Vigna luteola</i> A. Gray	---	tp
<i>Zollernia latifolia</i> Smith	---	av
FAMÍLIA FLACOURTIACEAE		
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	guaçatunga, guaçatunga-branca	av
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	cambroé, guaçatunga	av
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	carvalhinho, chá-de-bugre	av
FAMÍLIA GESNERIACEAE		
<i>Codonanthe devosiana</i> Lem.	---	ep
<i>Codonanthe gracilis</i> (Mart.) Hanst.	---	ep
<i>Nematanthus fissus</i> (Vell.) L.E. Skog.	juquitiba	ep
<i>Nematanthus jolyanus</i> (Handro) Chautems	---	ep
<i>Nematanthus tessmannii</i> (Hoehne) Chautems	---	ep
FAMÍLIA HYDROCHARITACEAE		
<i>Egeria densa</i> Planch.	elódea	hb
FAMÍLIA IRIDACEAE		
<i>Neomarica candida</i>	íris-da-praia	hb
FAMÍLIA JUNCACEAE		
<i>Juncus acutus</i> L.	junco-agudo	hb
FAMÍLIA LAMIACEAE		
<i>Ocimum selloi</i> Benth.	alfavaca	hb
FAMÍLIA LAURACEAE		
<i>Aiouea saligna</i> Meissn.	canela-vermelha	av
<i>Aniba firmula</i> (Nees) Mez	canela	av
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	canela-fogo	av
<i>Cryptocarya moschata</i> Ness & Mart.	canela-batalha, louro-precioso	av
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) Macbr.	canela-toiça, canela-sebo, canela-frade	av
<i>Nectandra leucantha</i> Nees	canela-seca, canela-branca	av
<i>Nectandra membranacea</i> Griseb.	canela-branca	av
<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees	canela-ferrugem, canela-amarela	av
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	canela-amarela	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	canela-amarela, canela-amarela-de-cheiro	av
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	canela-preta, canela-bicha	av
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	canela-amarela	av
<i>Ocotea puberula</i> Nees	canela-guaicá, canela-sebo	av
<i>Ocotea pulchella</i> Mart.	canela-lageana, canela-do-brejo	av
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	---	av
<i>Ocotea tristis</i> Mart. ex Nees	canelinha, canelhina-miúda	av
FAMÍLIA LECYTHIDACEAE		
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	cachimbo-de-macaco, estopeira, jequitibá	av
FAMÍLIA LOGANIACEAE		
<i>Spigelia cf dusenii</i> L. B. Smith	---	hb
FAMÍLIA LORANTHACEAE		
<i>Loranthaceae</i> 1	---	hp
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl) Eichl.	erva-de-passarinho, enxerto-de-passarinho	hp
<i>Phoradendron piperoides</i> Nutt.	erva-de-passarinho	hp
<i>Struthanthus vulgaris</i> Mart.	erva-de-passarinho	hp
FAMÍLIA LYTHRACEAE		
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbr.	sete-sangrias	hb
FAMÍLIA MALPIGHIACEAE		
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. St.-Hil.	muchita, baga-de-tucano	av
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> A. Juss.	---	tp
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A. Juss.	---	tp
FAMÍLIA MALVACEAE		
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	algodão-do-brejo, algodoeiro-da-praia	ab
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	malvavisco	ab
FAMÍLIA MARANTACEAE		
<i>Calathea monophylla</i> (Vell.) Körn	---	hb
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	calateia-zebra, caeté	hb
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe	---	hb
<i>Marantaceae</i> 1	---	hb
<i>Marantaceae</i> 2	---	hb
FAMÍLIA MARCGRAVIACEAE		
<i>Marcgravia polyantha</i> Delpino	hera-das-árvores	tp
<i>Norantea brasiliensis</i> Choisy	flor-dpapagaio	tp
FAMÍLIA MAYACCACEAE		
<i>Mayacca fluviatilis</i> Aubl.	lodo, musgo-de-flor	hb
FAMÍLIA MELASTOMATACEAE		
<i>Bertolonia acuminata</i> Gardner	---	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Bertolonia mosenii</i> Cogn.	---	ep
<i>Pleiochiton blepharodes</i> (DC.) Reginato et al.	pixirica	ep
<i>Clidemia</i> sp.	---	hb
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	pixiricão	av
<i>Miconia cinerascens</i> var. <i>robusta</i> Wurdack	pixirica	av
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naud.	jacatirão	av
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	pixirica	ab
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.	pixirica	av
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner	pixirica	av
<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	pixirica	av
<i>Miconia tristis</i> ssp. <i>australis</i> Wurdack	pixirica	av
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	pixirica	hb
<i>Pleiochiton</i> cf. <i>ebracteatum</i> Triana	---	ep
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	---	hb
<i>Tibouchina clinopodifolia</i> (DC) Cogn.	quaremeirinha	hb
<i>Tibouchina pulchra</i> (Cham.) Cogn.	quaresmeira, manacá-da-serra	av
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.	quaresmeira, quaresmeira-do-brejo	ab
FAMÍLIA MELIACEAE		
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana, canharana	av
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.	cedro, cedro-rosa, cedrinho	av
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	pau-de-arco, camboatá, catiguá-morcego	av
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	baga-de-morcego	av
FAMÍLIA MIMOSACEAE		
<i>Inga</i> cf. <i>sessilis</i> DC.	ingá-macaco	av
<i>Inga edulis</i> Mart.	ingá-cipó, ingá-de-metro, rabo-de-mico	av
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	---	av
<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	av
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	maricá	av
<i>Mimosa pudica</i> L.	dorme-dorme, planta sensitiva, dormideira	hb
<i>Pseudopiptadenia warmingii</i> Benth.	cauvi	av
FAMÍLIA MYRISTICACEAE		
<i>Virola bicuhyba</i> Schott	bicuíba, candeia-de-caboclo, bocuva	av
FAMÍLIA MONIMIACEAE		
<i>Mollinedia argyrogyna</i> Perkins	---	av
<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins	pimenteira	ab
<i>Mollinedia jorgearum</i> Peixoto	---	av
<i>Mollinedia schottiana</i> Perkins	pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	erva-de-santo-antonio, capixim	ab

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA MORACEAE		
<i>Brosimum glaucum</i> Taub.	---	av
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	---	av
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	av/ep
<i>Dorstenia hirta</i> Desv.	caiapiá-hirto	hb
<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott	figueira-purgante	av
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & Bouché	gameleira-branca	av/ep
<i>Ficus insipida</i> Willd.	caxinguba	av/ep
<i>Ficus luschnatiana</i> (Miq.) Miq.	figueira	av
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-branca	av/ep
<i>Ficus</i> sp1	---	av/ep
<i>Ficus</i> sp2	---	av/ep
<i>Ficus</i> sp3	---	av/ep
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burg., Lanj. & Boer	chincho, canxim, capiricica	av
FAMÍLIA MYRSINACEAE		
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	capororoca	av
<i>Myrsine intermedia</i>	---	av
<i>Myrsine parvifolia</i> A. DC.	capororoca, capororoca-do-banhado	av
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	av
<i>Myrsine venosa</i> A. DC.	---	av
FAMÍLIA MYRTACEAE		
<i>Calycorectes australis</i> Legrand	---	av
<i>Calyptranthes concinna</i> DC.	guamirim	av
<i>Calyptranthes grandifolia</i> Berg	guamirim	av
<i>Calyptranthes lanceolata</i> Berg var. <i>catharinensis</i> Legrand	---	av
<i>Calyptranthes strigipes</i> Berg	guamirim-chorão	av
<i>Campomanesia neriiflora</i> (Berg) Nied.	---	av
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg	guabiroba	av
<i>Eugenia catharinensis</i> Legrand	guamirim	av
<i>Eugenia cf candolleana</i> DC.	cambuí-roxo, araçá-da-mata	av
<i>Eugenia cf. burkartiana</i> (Legrand) Legrand	guamirim	av
<i>Eugenia jambos</i> L.	---	av
<i>Eugenia melanogyna</i> (Legr.) Sobral	---	av
<i>Eugenia multicostata</i> Legrand	araçá-piranga, pau-alazão	av
<i>Eugenia obovata</i> Berg	---	av
<i>Eugenia stigmatica</i> DC.	guarimi	av
<i>Eugenia umbelliflora</i> Berg	guapê, baguaçu	av
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (Legrand & Kausel) Legrand	guamirim, guamirim-branco	av
<i>Marlierea obscura</i> Berg	goiaba	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Marlierea reitzii</i> Legrand	---	av
<i>Marlierea sylvatica</i> (Berg) Kiaersk.	araçarana	av
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	guarapuruna	av
<i>Myrceugenia reitzii</i> Legr. & Kaus.	---	av
<i>Myrcia acuminatissima</i> Berg	batitô	av
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.	guamirim	av
<i>Myrcia cf. dichrophylla</i> Legrand	---	av
<i>Myrcia flagellaris</i> (D.Legrand) Sobral	---	av
<i>Myrcia glabra</i> (Berg) Legrand	guamirim	av
<i>Myrcia insularis</i> Gardn.	---	av
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC. var. <i>glaucescens</i> (Berg) Legrand	pedra-ume-caá	av
<i>Myrcia palustris</i> DC.	pitangueira-do-mato	av
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq. var. <i>pubipetala</i>	goiabão	av
<i>Myrcia pubipetala</i> var. <i>magnifolia</i> Legrand	goiabão	av
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim	av
Myrtaceae 3	---	av
Myrtaceae 5	---	av
Myrtaceae 8	---	av
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	av
<i>Plinia trunciflora</i> (Berg) Kausel	jaboticabeira	av
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá	av
FAMÍLIA NYCTAGINACEAE		
<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	maria-mole	ab
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	louro-branco, joão-mole, fruta-de-pombo	av
<i>Neea pendulina</i> Heimerl	maria-mole, maria-mole-pêndula	hb
<i>Neea schwackeana</i> Heimerl	maria-mole	hb
Nyctaginaceae 1	---	hb
<i>Pisonia zapallo</i> Griseb.	anzol-de-lontra	av
FAMÍLIA OCHNACEAE		
<i>Ouratea parviflora</i> (DC.) Baill.	canela-de-veado, coração-de-bugre-vermelho, quatinga	ab
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	---	hb
FAMÍLIA OLACACEAE		
<i>Heisteria silviani</i> Schwacke	casca-de-tatu	av
FAMÍLIA OLEACEAE		
<i>Tetrastylidium grandifolium</i> (Baill.) Sleum.	mandigaú, pau-tatu	av
FAMÍLIA ONAGRACEAE		
<i>Ludwigia elegans</i> (Camb.) H.Hara	cruz-de-malta	hb
FAMÍLIA ORCHIDACEAE		
<i>Brassavola tuberculata</i> Hook.	orquídea	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Campylocentrum cf. aromaticum</i> Barb. Rodr.	orquídea	ep
<i>Catasetum cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.	catasseto	ep
<i>Cattleya forbesii</i> Lindl.	orquídea	ep
<i>Dichaea anchorifera</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea australis</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orquídea	ep
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	orquídea	ep
<i>Encyclia fragrans</i> (Sw.) Lemée	orquídea	ep
<i>Encyclia vespa</i> (Vell.) Pabst	orquídea	ep
<i>Epidendrum cf. pseudo-difforme</i> Schltr.	---	ep
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	boca-de-dragão	ep
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	orquídea	ep
<i>Epidendrum</i> sp2	orquídea	ep
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb.f.	orquídea	ep
<i>Gomesa crispa</i> Klotzsch & Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Gomesa</i> sp.	orquídea	ep
<i>Habenaria paranaensis</i> Hoehne	orquídea	hb
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	---	ep
<i>Jacquinella globosa</i> (Jacq.) Schltr.	---	ep
<i>Lankesterella ceracifolia</i> (Barb. Rodr.) Mansf.	---	ep
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Heterotaxis brasiliensis</i> (Brieger & Illg) F.Barros	orquídea	ep
<i>Maxillaria</i> spp.	---	ep
<i>Mesadenella esmeralda</i> (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay	---	hb
<i>Miltonia regnelli</i> Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Octomeria cf. gracilis</i> Lodd.	---	ep
<i>Octomeria fibrifera</i> Schltr.	---	ep
<i>Octomeria</i> sp1	---	ep
<i>Octomeria</i> sp2	---	ep
<i>Oncidium flexuosum</i> (Kunth) Lindl.	chuva-de-ouro, dama-dançante	ep
<i>Orchidaceae</i> sp2	---	ep
<i>Orchidaceae</i> spp	---	ep
<i>Phymatidium microphyllum</i> Barb. Rodr.	---	ep
<i>Pleurothallis saundersiana</i> Rchb. f.	orquídea	ep
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay	orquídea	ep
<i>Reichenbachanthus reflexus</i> Koll., Porto & Brade	---	ep
<i>Rodriguezia bracteata</i> (Vell.) Hoehne	---	ep
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	---	ep
<i>Stelis</i> sp	---	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzsch	orquídea	ep
<i>Zygostates cornuta</i> Lindl.	---	ep
FAMÍLIA PASSIFLORACEAE		
<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá	tp
FAMÍLIA PHYTOLACCACEAE		
<i>Phytolacca dioica</i> L.	ceboleiro	av
FAMÍLIA PIPERACEAE		
<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	---	ep
<i>Peperomia calophylla</i> Yunck.	---	hb
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw.) DC.	---	ep
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	---	ep
<i>Peperomia obtusifolia</i> Miq.	---	ep
<i>Peperomia pereskiiifolia</i> (Jacq.) Kunth	---	ep
<i>Peperomia pseudoestrellensis</i> C.DC.	---	ep
<i>Peperomia quadrifolia</i> Kunth	---	ep
<i>Peperomia</i> sp1	---	ep
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & Mey.	erva-de-vidro	ep
<i>Piper aduncum</i> L.	pariparoba	ab
<i>Piper amplum</i> Kunth	---	hb
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	pariparoba	ab
<i>Piper caldense</i> C. DC.	paguarandi, jaborandi	hb
<i>Piper cernuum</i> Vell.	pimenta-de-macaco	ab
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	pariparoba	hb
<i>Piper hispidum</i> C. DC.	---	hb
<i>Piper lindbergii</i> DC.	---	hb
<i>Piper malacophyllum</i>	---	hb
<i>Piper miquelianum</i> DC.	---	hb
<i>Piper mollicomum</i>	pariparoba, pau-de-junta	hb
<i>Piper solmsianum</i> DC.	caapeba, jaguarandi	hb
FAMÍLIA POACEAE		
<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	---	hb
<i>Andropogon arenarius</i> Hack.	---	hb
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro, capim andaime	hb
<i>Andropogon leucostachyus</i> H.B.K.	capim-membeca, capim-colchão	hb
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	---	hb
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.	---	hb
<i>Paspalum distichum</i> L.	---	hb
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	capim-rabo-de-raposa, rabo-de-gato	hb
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel	capim-pratuá, capim-do-mangue	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Spartina ciliata</i> Brongn.	capim-das-dunas	hb
<i>Spartina densiflora</i> Brongn.	---	hb
FAMÍLIA PODOCARPACEAE		
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Eichler	---	av
FAMÍLIA POLYGALACEAE		
<i>Polygala cf. cyparissias</i> A. St.-Hil. & Moq.	gelol-da-praia	hb
FAMÍLIA POLYGONACEAE		
<i>Coccoloba warmingii</i> Meiss.	racha-ligeiro	av
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum meissnerianum</i> Cham. & Schltdl.	erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia, pimenta-d'água	hb
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	erva-de-bicho	hb
FAMÍLIA PONTEDERIACEAE		
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	aguapé	hb
FAMÍLIA QUIINACEAE		
<i>Quiina glaziovii</i> Engl.	juruvarana, catuteiro-vermelho	av
FAMÍLIA RHIZOPHORACEAE		
<i>Rhizophora mangle</i> L.	mangue-vermelho	av
FAMÍLIA ROSACEAE		
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	pessegueiro-do-mato, pessegueiro-bravo	av
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	amoreira-silvestre	tp
FAMÍLIA RUBIACEAE		
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K.Schum.	---	av
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	apuruizinho-do-mato, canela-de-veado	av
<i>Bathysa meridionalis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	macuqueiro	av
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	cainca	tp
<i>Chomelia</i> sp.	viuvinha	ab
<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	---	hb
<i>Diodia radula</i> Cham. & Schltdl.	erva-de-lagarto	hb
<i>Diodia saponariifolia</i> (Cham. & Schltdl.) K. Schum.	poaia-do-brejo, perna-de-pomba	hb
<i>Geophila repens</i> (L.) J. M. Johnston	moranguinho-do-mato, cauá-piri, cauá-pixi	hb
<i>Hilila illustris</i> (Vell.) K. Schum.	---	ep
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	baga-de-macaco	ab
<i>Psychotria barbiflora</i> DC.	---	ab
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	carne-de-vaca, cafeeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.	cafeeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schltdl.) Wawra	grandiúva-d'anta, flor-de-cera	ab
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	véu-de-noiva, buquê-de-noiva	ab

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Rudgea villiflora</i> K.Schum. ex Stand.	---	ab
FAMÍLIA RUTACEAE		
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	cutia, cutia-amarela	av
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	mamica-de-cadela	av
FAMÍLIA SABIACEAE		
<i>Meliosma sellowi</i> Urb.	pau-fernandes	av
FAMÍLIA SAPINDACEAE		
<i>Allophyllus edulis</i> (A. St.-Hil.) Radlk.	chal-chal, aberta-goela, бага-de-morcego	av
<i>Allophyllus petiolatus</i> Radlk.	vacum-de-folha-larga, chal-chal	av
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá-de-folha-grande	av
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá-branco	av
<i>Matayba juglandifolia</i> Radklf.	camboatá-amarelo, pau-de-pombo	av
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	cipó-timbó	tp
FAMÍLIA SAPOTACEAE		
<i>Chrysophyllum inornatum</i> Mart.	aguaí, aguaí-da-serra	av
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	av
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	pelote-de-macaco	av
<i>Pouteria durlandii</i> (Standley) Baehni ssp <i>durlandii</i>	---	av
FAMÍLIA SCHROPHULARIACEAE		
<i>Scoparia dulcis</i> L.	tupiçaba, vassourinha	hb
FAMÍLIA SMILACACEAE		
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	salsaparrilha	tp
FAMÍLIA SOLANACEAE		
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	bagade-sabiá, marianeira, fruto-de-sabiá	ab
<i>Cestrum intermedium</i> Sednt.	coerana	ab
<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	joá, joá-melancia, mata-cavalo	hb
<i>Solanum americanum</i> Mill.	erva-moura, maria-pretinha	hb
<i>Solanum flaccidum</i> Vell.	joá-cipó-cheiroso	tp
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	coerana, tintureiro, buquê-de-noiva	av
FAMÍLIA SYMPLOCACEAE		
<i>Symplocos</i> sp.	---	av
FAMÍLIA THEACEAE		
<i>Gordonia fruticosa</i> Schrad.	pau-de-santa-rita, santa-rita	av
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Camb.	pinta-moça	av
FAMÍLIA THYMELAEACEAE		
<i>Daphnopsis</i> sp	---	ab
FAMÍLIA TYPHACEAE		
<i>Typha dominguensis</i> Kunth	taboa	hb
FAMÍLIA ULMACEAE		

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Celtis cf. tala</i> Gillies ex Planch.	esporão-de-galo, taleira	tp
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	grandiúva	av
FAMÍLIA URTICACEAE		
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	urtigão, urtigão-bravo	hb
<i>Urera nitida</i> (Vellozo) P. Brack	urtigão	hb
FAMÍLIA VERBENACEAE		
<i>Avicennia schaueriana</i> Stapf & Lechmere ex Moldenke	mangue-preto	av
<i>Cytharexylum myrianthum</i> Cham.	tucaneira	av
<i>Lantana camara</i> L.	camará, camaradinha	ab
<i>Vitex polygama</i> Cham.	tarumã, maria-preta, azeitona-do-mato	av
FAMÍLIA VOCHYSIACEAE		
<i>Vochysia bifalcata</i> Warm.	guaricica, pau-amarelo, vinheiro	av

TABELA 2. ESPÉCIES DE PTERIDÓFITAS REGISTRADAS NA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

TÁXONS	NOME COMUM
FAMÍLIA ASPLENIACEAE	
<i>Asplenium cf. gastonis</i>	---
<i>Asplenium mucronatum</i>	---
<i>Asplenium serra</i> Langsd. & Fischer	---
FAMÍLIA BLECHNACEAE	
<i>Blechnum binervatum</i> (Poir) C.V. Morton & Lellinger	---
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	---
<i>Blechnum occidentale</i> L.	---
<i>Blechnum serrulatum</i> Rich.	---
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) Hook.	---
FAMÍLIA CYATHEACEAE	
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	xaxim
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	xaxim
<i>Cyathea leucofolis</i> Domin	---
<i>Cyathea phallerata</i> Mart.	---
FAMÍLIA DAVALLIACEAE	
<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Kreg	---
FAMÍLIA DENNSTAEDTIACEAE	
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	---
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	---
FAMÍLIA DRYOPTERIDACEAE	
<i>Diplazium cristatum</i> (Desr.) Alston	---
<i>Olfersia cervina</i> (L.) Kunze	---

TÁXONS	NOME COMUM
<i>Polybotrya cylindrica</i> Kaulf.	---
<i>Rumorha adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	samabaia-preta
FAMÍLIA GRAMMITIDACEAE	
<i>Cochlidium serrulatum</i> (Sw.) L.E.Bishop	---
<i>Lellingeria</i> sp.	---
FAMÍLIA HYMENOPHYLLACEAE	
<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.	---
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.	---
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.	---
<i>Trichomanes pyxidiferum</i> L.	---
FAMÍLIA LOMARIOPSIDACEAE	
<i>Lomariopsis</i> sp	---
FAMÍLIA LYCOPODIACEAE	
<i>Huperzia flexibilis</i> (Fée) B. Øllg.	---
<i>Lycopodiella alopecuroides</i> (L.) Cranfill.	---
<i>Lycopodium</i> sp.	pinheirinho
FAMÍLIA OSMUNDACEAE	
<i>Osmunda palustris</i> Schrad.	---
FAMÍLIA POLYPODIACEAE	
<i>Campyloneurum major</i> (Hyeron. & Hicken) Lellinger.	---
<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota	---
<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston	---
<i>Microgramma vacciniifolia</i> (Langsd. & Fisch.) Copel.	---
<i>Pecluma paradisae</i> (Langsd. & Fischer). M.G. price	---
<i>Pecluma recurvata</i> (Kaulf.) M.G. Price	---
<i>Pleopeltis angusta</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	---
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) Fourn.	---
<i>Polypodium catharinae</i> Langsd. & Fisch.	---
<i>Polypodium fraxinifolium</i> Jacq.	---
<i>Polypodium hirsutissimum</i> Raddi	---
<i>Polypodium meniscifolium</i>	---
FAMÍLIA PTERIDACEAE	
<i>Acrostichum danaefolium</i> Langsd. & Fisch.	---
<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link	---
<i>Pteris vittata</i> L.	---
FAMÍLIA SCHIZAEACEAE	
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	---
<i>Lygodium volubile</i> Sw.	---
<i>Schizaea subtrijuga</i> Mart.	---

TÁXONS	NOME COMUM
FAMÍLIA SELAGINELLACEAE	
<i>Selaginella cf. sulcata</i> (Desv. ex Poir.) Spring. ex Mart.	---
FAMÍLIA TECTARIACEAE	
<i>Tectaria incisa</i> Cav.	---
FAMÍLIA VITTARIACEAE	
<i>Radiovittaria stipitata</i> (Kunze) Crane	---
<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.	---

TABELA 3. ESPÉCIES EXÓTICAS PARA A FITOFISIONOMIA ENCONTRADAS NA RESERVA NATURAL DAS ÁGUAS

TÁXONS	HÁBITO	NOME COMUM
FAMÍLIA AMARANTHACEAE		
<i>Amaranthus viridis</i> L.	hb	---
FAMÍLIA ANNONACEAE		
<i>Annona squamosa</i> L.	av	condessa, fruta-do-conde
FAMÍLIA APIACEA		
<i>Centella asiatica</i>	hb	centela
FAMÍLIA APOCYNACEAE		
<i>Allamanda cathartica</i> L.	ab	alamanda
FAMÍLIA ARACEAE		
<i>Calladium x hortulanum</i> Birdsey	hb	caládio
FAMÍLIA ARAUCARIACEAE		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	av	araucária
FAMÍLIA ASPARAGACEAE		
<i>Dracaena fragrans</i>	ab	dracena
FAMÍLIA BALSAMINACEAE		
<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.	hb	maria-sem-vergonha
FAMÍLIA BIGNONIACEAE		
<i>Crescentia cujete</i> L.	av	cuieira
FAMÍLIA BIXACEAE		
<i>Bixa orellana</i> L.	ab	urucum
FAMÍLIA CAMPANULACEAE		
<i>Isotoma longiflora</i> Presl	hb	---
FAMÍLIA CANNACEAE		
<i>Canna limbata</i> Roscoe	hb	biri
FAMÍLIA COMMELINACEAE		
<i>Tradescantia zebrina</i> Hort. ex Loud.	hb	---
FAMÍLIA FABACEAE		
<i>Trifolium repens</i>	hb	trevo-branco

TÁXONS	HÁBITO	NOME COMUM
FAMÍLIA LAURACEAE		
<i>Persea americana</i> Mill.	av	abacateiro
FAMÍLIA MAGNOLIACEAE		
<i>Magnolia betongensis</i> (Craib) H.Keng	av	magnólia
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	av	magnólia-sempre-verde
<i>Michelia champaca</i>	av	magnólia-amarela
FAMÍLIA MALPIGHIACEAE		
<i>Malpighia glabra</i> L.	ab	acerola
FAMÍLIA MALVACEAE		
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	ab	---
FAMÍLIA MORACEAE		
<i>Artocarpus integrifolia</i> L.f.	av	jaca
<i>Morus nigra</i> L.	av	amorinha
FAMÍLIA MUSACEAE		
<i>Musa rosea</i> Baker	hb	bananeira-de-semente
<i>Musa X paradisiaca</i> L.	hb	bananeiras
FAMÍLIA MYRTACEAE		
<i>Eugenia uniflora</i> L.	av	pitangueira
<i>Psidium guajava</i> L.	av	goiaba
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	av	guapê
FAMÍLIA PHYTOLACCACEAE		
<i>Phytolacca americana</i> L.	hb	fitolaca, baga-moira
FAMÍLIA PINACEAE		
<i>Pinus</i> spp.	av	pinus
FAMÍLIA POACEAE		
<i>Brachiaria humidicola</i>	hb	braquiária
<i>Brachiaria mutica</i> (Forsk.) Stapf	hb	braquiária
<i>Brachiaria procumbens</i>	hb	braquiária
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	hb	---
<i>Chusquea</i> sp.	hb	criciúma
<i>Chusquea</i> sp.2		bambu
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	hb	---
<i>Digitaria fuscescens</i> (Presl) Henrard	hb	---
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	hb	---
<i>Melinis minutiflora</i> Beauv.	hb	---
<i>Panicum maximum</i> Jacq.	hb	---
<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	hb	---
FAMÍLIA ROSACEAE		
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	av	nêspera

TÁXONS	HÁBITO	NOME COMUM
FAMÍLIA RUTACEAE		
<i>Citrus limon (L.) Burm. f.</i>	av	limoeiro
<i>Citrus reticulata Blanco</i>	av	mixirica
FAMÍLIA SCROPHULARIACEAE		
<i>Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.</i>	av	quiri
FAMÍLIA VERBENACEAE		
<i>Clerodendron speciosissimum Paxton</i>	ab	---
<i>Stachytarpheta maximilianii Schranke</i>	hb	gervão
FAMÍLIA ZINGIBERACEAE		
<i>Hedychium coccineum Wall</i>	hb	---
<i>Hedychium coronarium Koehne</i>	hb	lírio-do-brejo, jasmim



/SPVSBrasil
www.spvs.org.br

