

RESERVA NATURAL GUARICICA

Plano de Manejo

RPPN ÁGUAS BELAS / RPPN RIO CACHOEIRA
Antonina/PR - Dezembro 2024

ANEXO 4

Levantamento da Fauna



LISTA DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS ENCONTRADAS NA RESERVA NATURAL GUARICICA

LEGENDA

AMBIENTE: **flo** → floresta **aab** → áreas abertas **aqu** → aquático **fos** → fossorial **ter** → terrícola **arb** → arborícola
Baseado parcialmente em Segalla (2003) e Marques (2017)

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
FAMILIA BRACHYCEPHALIDAE					
<i>Ischnocnema henselii</i> (Peters, 1872)		flo arb fos	LC	LC	LC
<i>Ischnocnema sambaqui</i> (Castanho & Haddad, 2000)		flo arb fos	LC	LC	LC
FAMILIA BUFONIDAE					
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i> Izecksohn, 1968	sapo	flo aab ter aqu	LC	LC	LC
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu	flo aab ter aqu	LC	LC	LC
<i>Rhinella ornata</i> (Baldissera-Jr,Caramaschi & Haddad, 2004)		flo aab	LC	LC	LC
FAMILIA CENTROLLENIDAE					
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	perereca-de-vidro	flo arb aqu	LC	LC	LC
FAMILIA CRAUGASTORIDAE					
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	flo arb aqu	LC	LC	LC
FAMILIA CYCLORAMPHIDAE					
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo	flo ter aqu	LC	LC	LC
FAMILIA HYLIDAE					
<i>Aplastodiscus ehrhardti</i> (Müller, 1924)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	perereca	flo aab arb aqu	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus microps</i> (Peter, 1872)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus minutus</i> (Peter, 1872)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus nahdereri</i> (B. Lutz & Bokermann, 1963)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Dendropsophus wernerii</i> (Cochran, 1952)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Boana albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Boana faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo-martelo	flo aab arb aqu	LC	LC	LC
<i>Boana semilineatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Phyllomedusa distincta</i> A. Lutz in B. Lutz, 1950	perereca-verde	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Pseudis cardosoi</i> Kwet, 2000	rã-d'água	flo aab arb aqu	LC	LC	LC
<i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Scinax perpusillus</i> (A. Lutz & B. Lutz, 1939)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Scinax littoralis</i> (Pombal & Gordo, 1991)		flo, arb	LC	LC	LC
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
<i>Scinax imbegue</i> Nunes, Kwet & Pombal, 2012		flo arb	LC	LC	LC
<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca	flo aab arb aqu	LC	LC	LC
<i>Scinax tymbamirim</i> Nunes, Kwet & Pombal, 2012		flo arb	LC	LC	LC
<i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867)	perereca	flo arb aqu	LC	LC	LC
FAMILIA HYLODIDAE					
<i>Hylodes cardosoi</i>		flo ter arb aqu	EN	LC	LC
<i>Hylodes heyeri</i> Haddad, Pombal & Bastos, 1996		flo ter arb aqu	LC	LC	LC
FAMILIA LEPTODACTYLIDAE					
<i>Adenomera marmorata</i> (Steindachner, 1867)		flo arb	LC	LC	LC
<i>Adenomera bokermanni</i>		flo arb	LC	LC	LC
<i>Leptodactylus notoaktites</i> Heyer, 1978	rã-gota	flo ter aqu	LC	LC	LC
FAMILIA LEIUPERIDAE					
<i>Physalaemus marmoratus</i>	rãzinha	flo aab ter aqu	LC	LC	LC
FAMILIA MICROHYLIDAE					
<i>Elachistocleis bicolor</i> (Valenciennes in Guérin-Ménéville, 1838)		flo arb	LC	LC	LC
FAMÍLIA ODONTOPHRYNIDAE					
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)		flo	LC	LC	LC
FAMÍLIA PHYLLOMEDUSIDAE					
<i>Phyllomedusa distincta</i> A. Lutz in B. Lutz, 1950		flo	LC	LC	LC

LISTA DE ESPÉCIES DE RÉPTEIS ENCONTRADOS NA RESERVA NATURAL GUARICICA

LEGENDA

AMBIENTE: **fl** → florestas **re** → restingas **mn** → mangues **ab** → áreas abertas
aq → aquático: sendo (**lt**): lótico; (**ln**): lântico; (**ma**): marinho

HÁBITOS: **fo** → fossorial **sf** → semifossorial **ter** → terrícola **aq** → aquático sensu stricto **saq** → semi-aquático
sab → semi-arborícola **ab** → arborícola

STATUS: **fr** → frequente **pfr** → pouco frequente **rr** → raro **am** → ameaçado de extinção **in** → insuficientemente
 Baseado parcialmente em Morato, 2003

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
TESTUDINES					
FAMILIA CHELIDAE					
Hydromedusa tectifera Cope, 1869	cágado-cabeça-de-cobra	aq (lt)	NC	LC	LC
FAMILIA CHELONIIDAE					
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)	tartaruga-cabeçuda	aq (ma)	VU	EN	VU
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)	tartaruga-verde	aq (ma)	EN	VU	VU
CROCODYLIA					
FAMILIA ALLIGATORIDAE					
Caiman latirostris (Daudin, 1802)	jacaré-de-papo-amarelo	aq (ln, ma), mn	LC	LC	LC
SQUAMATA - LACERTILIA					
FAMILIA POLYCHROTIDAE					
Enyalius iheringii Boulenger, 1885	camaleão/iguaninha	fl	LC	LC	LC
FAMILIA GEKKONIDAE					
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)	lagartixa-de-parede	fl, re, ab	LC	NC	NA
FAMILIA ANGUIDAE					
Diploglossus fasciatus (Gray, 1831)	lagarto-coral	fl	LC	LC	LC
Ophiodes fragilis Raddi,1820	cobra-de-vidro	fl, re, ab	LC	LC	LC
FAMILIA GYMNOPTHALMIDAE					
Placosoma glabellum (Peters, 1870)	lagarto	fl, re, ab	LC	LC	LC
FAMILIA TEIIDAE					
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto, teiú	fl, re, mn, ab	LC	LC	LC
SQUAMATA - AMPHISBAENIA					
FAMILIA AMPHISBAENIDAE					
Leposternon microcephalum (Wagler, 1824)	cobra-cega	fl, re, ab	LC	LC	LC
SQUAMATA - SERPENTES					
FAMILIA COLUBRIDAE					

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl, re, ab	LC	LC	LC
<i>Chironius fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl, ab (?)	LC	LC	LC
<i>Chironius foveatus</i> (Bailey, 1955)	cobra-cipó, voadeira	fl, re, ab	LC	LC	LC
<i>Chironius laevicollis</i> Dixon, Wiest & Cei, 1993	caninana-preta	fl, ab	LC	LC	LC
FAMILIA SPILOTES					
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana	fl, re	LC	LC	LC
FAMILIA DIPSADIDAE					
<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	muçurana, bairú	fl	LC	LC	LC
<i>Dipsas incerta</i> (Jan, 1863)	dormideira	fl	DD	LC	NC
<i>Dipsas variegata</i> Amarel, 1923	dormideira	fl	LC	LC	LC
<i>Dipsas indica</i> Laurenti, 1768	dormideira	fl	LC	LC	NC
<i>Dipsas neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira-cinzenta/anelada	fl, re, ab	LC	LC	LC
<i>Echianthera cephalostriata</i> Di-Bernardo, 1996	cobrinha-cipó	fl	LC	LC	LC
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	coral-falsa/boicorá	fl, re, ab	LC	LC	LC
<i>Erythrolamprus miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-lisa	fl, re, mn, ab, aq (lt, ln, ma)	LC	LC	LC
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825)	cobra-d'água	aq (lt, ln)	LC	LC	LC
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dorme-dorme	fl	LC	LC	LC
<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Duméril, 1854	coral-falsa	fl, re	LC	LC	LC
<i>Xenodon neuwiedi</i> Günther, 1863	jararaca-falsa	fl	LC	LC	LC
FAMILIA ELAPIDAE					
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	fl, re, ab	LC	LC	LC
FAMILIA VIPERIDAE					
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924)	jararaca	fl, re, ab	LC	LC	LC
<i>Bothrops jararacussu</i> Lacerda, 1884	jararacuçu	fl, re, ab	LC	LC	LC

LISTA DE ESPÉCIES DE AVES ENCONTRADOS NA RESERVA NATURAL GUARICICA

LEGENDA

AMBIENTE: **fpfm** → formações pioneiras de influência fluviomarinha **fpf** → formações pioneiras de influência fluvial
fod → floresta ombrófila densa primária **pa** → pastagem **ca** → fase inicial de floresta (capoeira)
cp → fase intermediária de floresta (capoeirão) **sc** → fase avançada de floresta (floresta secundária)
aa → áreas alteradas **aq** → ambientes aquáticos

Baseado parcialmente em Boçon, 2003

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
ORDEM TINAMIFORME					
FAMÍLIA TINAMIDAE					
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	fod	NT	NT	VU
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	fod-cp-sec	LC	LC	LC
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	inhambu-chororó	fod	NT	LC	EN
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	cap-cp-sec	LC	LC	LC
ORDEM ANSERIFORMES					
FAMÍLIA ANATIDAE					
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	fpfm-fpf	LC	LC	LC
ORDEM GALLIFORMES					
FAMÍLIA CRACIDAE					
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	fod-cp-sc	NT	LC	LC
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	fod	EN	EN	EN
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	fpfm-fod	LC	LC	
FAMÍLIA ODONTOPHORIDAE					
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	fod	LC	LC	LC
ORDEM COLUMBIFORMES					
FAMÍLIA COLUMBIDAE					
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pomba-asa-branca	fod-ca-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	fod-ca-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	ca-cp-aa	LC	LC	LC
ORDEM CUCULIFORMES					
FAMÍLIA CUCULIDAE					

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo	cp-ca-pa	LC	LC	LC
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	fod-cp-sc	LC	LC	LC
ORDEM NYCTIBIIFORMES					
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE					
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	fod-sc	LC	LC	LC
ORDEM CAPRIMULGIFORMES					
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE					
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788)	tuju	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	fod-sc	LC	LC	LC
ORDEM APODIFORMES					
FAMÍLIA APODIDAE					
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA TROCHILIDAE					
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	fpfm-fod-cp	LC	LC	LC
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-rajado	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	fod-cp	LC	LC	LC
<i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822)	topetinho-verde	fod-cp	LC	LC	LC
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	fpfm-fpf-fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	fpf-fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Chionomesa fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde		LC	LC	LC
ORDEM GRUIFORMES					
FAMÍLIA RALLIDAE					
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	sanã-do-capim	fpfm-fpf	LC	LC	NT
<i>Mustelirallus albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	fpfm-fpf	LC	LC	VU
<i>Aramides cajaneus</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	fpfm-fpf	LC	LC	VU

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	fpf-fod-sc	LC	LC	LC
ORDEM CHARADRIIFORMES					
FAMÍLIA CHARADRIIDAE					
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	fpf	LC	LC	LC
<i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825	batuíra-de-bando	fpfm	LC	LC	LC
FAMÍLIA SCOLOPACIDAE					
<i>Gallinago paraguaiæ</i> (Vieillot, 1816)	narceja	fpf	LC	LC	LC
<i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	fpfm	LC	LC	LC
FAMÍLIA JACANIDAE					
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	fpfm-fpf	LC	LC	LC
FAMÍLIA LARIDAE					
<i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823	gaivotão	Aq	LC	LC	LC
ORDEM SULIFORMES					
FAMÍLIA FREGATIDAE					
<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	fragata	Aq	LC	LC	LC
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE					
<i>Nannopterum brasilianum</i> (Gmelin, 1789)	biguá	fpfm-fpf	LC	LC	LC
ORDEM PELECANIFORMES					
FAMÍLIA ARDEIDAE					
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Tigrisoma fasciatum</i> (Such, 1825)	socó-boi-escuro	fpfm-fpf	LC	VU	VU
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Gmelin, 1789)	savacu	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	pa	LC	LC	LC
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	socó-grande	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	fpfm-fpf	LC	LC	LC
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE					
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	ca-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	colhereiro	fpfm-fpf	LC	LC	LC
ORDEM CATRARTIFORMES					
FAMÍLIA CATHARTIDAE					
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-preto	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Cathartes aura</i> Linnaeus, 1758	urubu-de-cabeça-vermelha	fod-ca-cp-sc	LC	LC	LC
ORDEM ACCIPITRIFORMES					
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE					
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pegamaco	fod	LC	LC	VU
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	fod	NT	LC	EN
<i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817)	gavião-bombachinha-grande	fod	LC	LC	NT
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	fod	LC	LC	LC
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
ORDEM STRIGIFORMES					
FAMÍLIA TYTONIDAE					
<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)	suindara	aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA STRIGIDAE					
<i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	pa-aa	LC	LC	LC
ORDEM TROGONIFORMES					
FAMÍLIA TROGONIDAE					
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-de-barriga-amarela	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Trogon chrysochloros</i> Pelzeln, 1856	surucuá-dourado	fod-cp-sc	LC	LC	LC
ORDEM CORACIIFORMES					
FAMÍLIA MOMOTIDAE					
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA ALCEDINIDAE					
<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	fpfm-fpf	LC	LC	LC
ORDEM GALBULIFORMES					
FAMÍLIA BUCCONIDAE					
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	barbudo-rajado	fod-sc	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
ORDEM PICIFORMES					
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE					
<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	tucano-de-bico-preto	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	saripoca-poca	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	fod-sc	NT	LC	VU
FAMÍLIA PICIDAE					
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	picapauzinho-de-coleira	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-carijó	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1819)	pica-pau-rei	Fod	LC	LC	LC
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-velho	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Piculus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	pa-ca-aa	LC	LC	LC
ORDEM FALCONIFORMES					
FAMÍLIA FALCONIDAE					
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	fod	LC	LC	LC
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	gavião-relógio	fod	LC	LC	LC
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiri-quiri	ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
ORDEM PSITTACIFORMES					
FAMÍLIA PSITTACIDAE					
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiu-cuiu	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica		LC	LC	NT
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	fpfm-fod-sc	NT	NT	VU
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883)	tuim-de-asa-azul	fod-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriba-de-testa-vermelha	fod-sc	LC	LC	LC
ORDEM PASSERIFORMES					
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE					
<i>Formicivora acutirostris</i> (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995)	bicudinho-do-brejo	fpfm-fpf	NT	VU	EN
<i>Rhopias gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-de-garganta-pintada	fod	LC	LC	LC
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	fod-sc	NT	LC	LC
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	fod	LC	LC	LC
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	fod	LC	LC	LC
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara-preta	fod	LC	LC	LC
<i>Myrmeciza squamosa</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-da-grota	fod	LC	LC	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	dituí	fod	LC	LC	LC
<i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	choquinha-de-dorso-vermelho	fod	LC	LC	LC
<i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE					
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	cuspidor-de-máscara-preta	fod	LC	LC	LC
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	fod-sc-cp-ca	LC	VU	LC
FAMÍLIA GRALLARIIDAE					
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE					
<i>Merulaxis ater</i> Lesson, 1830	entufado		LC	LC	LC
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho		LC	LC	LC
FAMÍLIA FORMICARIIDAE					
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	fod	LC	LC	LC
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA SCLERURIDAE					

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folha	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE					
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	fod-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1824	arapaçu-grande	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	Fod	LC	LC	LC
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso-do-sul	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA XENOPIIDAE					
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miudo	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA FURNARIIDAE					
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	ca-cp-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Anabacerthia lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859)	limpa-folha-ocráceo		LC	LC	LC
<i>Heliobletus contaminatus</i> Pelzelin, 1859	trepadorzinho	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Dendroma rufa</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	fod-ca-cp-sc	LC	LC	LC
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	fod-ca-cp	LC	LC	LC
FAMÍLIA PIPRIDAE					
<i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)	tangarazinho		LC	LC	LC
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	fod-sc-cp	LC	LC	LC
FAMÍLIA COTINGIDAE					
<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)	corocochó	fod	LC	LC	LC
<i>Carpornis melanocephala</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta	fod	NT	NT	VU
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc	LC	LC	NT
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra	fod	LC	NT	VU
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	fod	NT	LC	LC
FAMÍLIA TITYRIDAE					
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim	fod-sc	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	araponguinha-de-rabo-preto	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	araponguinha-de-cara-preta	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	fod-sc-cp	LC	LC	LC
FAMÍLIA OXYRUNCIDAE					
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA ONYCHORHYNCHIDAE					
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA PLATYRINCHIDAE					
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> (Wied, 1831)	patinho-de-asa-castanha	fod	VU	VU	VU
FAMÍLIA RHYNCHOCYCLIDAE					
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Phylloscartes paulista</i> Ihering & Ihering, 1907	não-pode-parar	fod	NT	LC	VU
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	fod	LC	LC	LC
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	fod	LC	LC	LC
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho		LC	LC	LC
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririzinho-do-mato	fod	NT	LC	LC
FAMÍLIA TYRANNIDAE					
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	cp-ca	LC	LC	LC
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzelin, 1868	tuque-pium	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinza	cp-ca	LC	LC	LC
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	fod	LC	LC	LC
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	fod	LC	LC	LC
<i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859	irrê	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira		LC	LC	LC
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	maria-assobiadeira	fod-sc-cp	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	fod-sc-cp-ca-pa	LC	LC	LC
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	pa-ca-cp-sc-aa	LC	LC	LC
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	nei-nei	fod-sc-cp-ca-pa	LC	LC	LC
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	fod-sc-cp-ca-pa	LC	LC	LC
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	cp-ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Tyrannus savana</i> Daudin, 1802	tesourinha	ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	cp-ca	LC	LC	LC
<i>Conopias trivirgatus</i> (Wied, 1831)	bem-te-vi-pequeno	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	pa-ca-cp	LC	LC	LC
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	fod-sc	LC	LC	LC
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	fod-sc	LC	LC	LC
FAMÍLIA VIREONIDAE					
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara-boreal		LC	LC	
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruviara	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA CORVIDAE					
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	fod-sc-cp	NT	LC	LC
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE					
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora		LC	LC	LC
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	fpfm-fpf	LC	LC	LC
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	fpf-ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	ca-pa-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE					
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 18234	corruíra	cp-ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande	fpfm-fpf	LC	LC	LC
FAMÍLIA POLIOPTILIDAE					
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	chirito	fod-sc-cp	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
FAMÍLIA TURDIDAE					
<i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818	sabiá-una	fod	LC	LC	LC
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1851	sabiá-poca	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	fod-sc-cp	LC	LC	LC
FAMÍLIA PASSERIDAE					
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	aa	LC	NA	NA
FAMÍLIA FRINGILLIDAE					
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA MOTACILIDAE					
<i>Anthus chii</i> Vieillot, 1818	caminheiro-zumbidor	cp-ca	LC	LC	LC
FAMÍLIA FRINGILLIDAE					
<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	pa-ca-cp-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA PASSERELLIDAE					
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	tico-tico	cp-ca-pa-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA ICTERIDAE					
<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	policia-inglesa-do-sul	ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	fpf-fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chupim	ca-pa-aa	LC	LC	LC
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	pássaro-preto	ca-pa-aa	LC	LC	LC
FAMÍLIA PARULIDAE					
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	fpfm-fpf-fod-cp-ca	LC	LC	LC
<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Myiothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	fpf-fod	LC	LC	LC
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830)	pula-pula	fod-sc-cp	LC	LC	LC
FAMÍLIA MITROSPINGIDAE					
<i>Orthogonyx chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA CARDINALIDAE					
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-de-bando	fod	LC	LC	LC
FAMÍLIA THRAUPIDAE					
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-ferrugem	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	fod-sc-cp-ca	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-pimenta	fod	LC	LC	LC
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	pa-ca-cp-aa	LC	LC	LC
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Loriotus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	fod	LC	LC	LC
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Ramphocelus bresilia</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1766)	bigodinho	fpf-pa-ca-cp-aa	LC	LC	LC
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	píxoxó	fod	VU	VU	EN
<i>Sporophila caerulea</i> (Vieillot, 1817)	coleirinha	pa-ca-cp-aa	LC	LC	LC
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	cp-ca-fpf	LC	LC	VU
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	pa-ca-cp-aa	LC	LC	LC
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)	sanhaço-de-encontro-amarelo	fod-sc-cp	LC	LC	LC
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	saíra-sete-cores	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saíra-militar	fod-sc-cp-ca-aa	LC	LC	LC

LISTA DE ESPÉCIES DE MAMÍFEROS VERIFICADOS NA RESERVA NATURAL GUARICICA

LEGENDA

AMBIENTE: **fod** → floresta ombrófila densa **fodtb** → floresta ombrófila densa de terras baixas
fodsm → floresta ombrófila densa submontana **vs** → vegetação secundária
vsfs → vegetação secundária-floresta secundária **vsc** → vegetação secundária-capoeirão
vscp → vegetação secundária-capoeira **ma** → manguezal **fpif** → formação pioneira de influência fluvial
aa → áreas alteradas **aq** → ambientes aquáticos

STATUS-LOCAL: **Co** → comum **Pc** → pouco comum **Ra** → raro

AMEAÇA: **Am** → ameaçado de extinção **Vu** → vulnerável **Qa** → quase ameaçada **Rb** → risco baixo
Di → dados insuficientes **nc** → não consta em lista oficiais **?** → status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status)

INDICAÇÃO: **In** → espécie indicadora **Ae** → animal especial


Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: 1 Ministério do Meio Ambiente (2008) e 2 IUCN (2008).

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
FAMÍLIA DIDELPHIDAE					
<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	cuíca-d'água	fpif	LC	LC	LC
<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	gambá	fodtb; fodsm	LC	LC	LC
<i>Didelphis aurita</i> (Wied-Neuwied, 1826)	gambá-de-orelha-preta		LC	LC	LC
<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	fodsm	LC	LC	DD
<i>Philander quica</i> (Temminck, 1824)	cuíca -de-quatro-olhos	fodsm;	LC	LC	LC
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE					
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	fodtb; fodsm	LC	LC	LC
FAMÍLIA DASYPODIDAE					
<i>Dasypus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha	fodtb;fodsm; vscap;vsc;vsfs	LC	LC	LC
<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-peludo, tatu-peba		LC	LC	LC
FAMÍLIA TAPIRIDAE					
<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	fodtb; fodsm	VU	VU	CR
FAMÍLIA CERVIDAE					
<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	veado-mateiro		DD	DD	Não encontrado
<i>Mazama juncunda</i> Duarte, 1996	veado-bororó	fodtb;fodsm; vscp; vsc; vsfs	VU	NT	VU
<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814)	veado-catingueiro	fodtb;fodsm; vscp; vsc; vsfs	LC	LC	LC
<i>Mazama nana</i> (Hensel, 1872)	veado mão-curta		VU	VU	VU
FAMÍLIA TAYASSUIDAE					
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto	fodtb;fodsm; vscp; vsc; vsfs	LC	LC	EN
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada	fodtb;fodsm; vscp; vsc; vsfs	VU	VU	CR
FAMÍLIA DELPHINIDAE					
<i>Sotalia fluviatilis</i> (Gervais & Deville, 1853)	tucuxi	aq	EN	NT	CR
<i>Tursiops truncatus</i>	golfinho-roaz		LC	LC	DD
FAMÍLIA ATELIDAE					
<i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766)	guariba, bugio	fodsm	VU	VU	CR
FAMÍLIA CEBIDAE					
<i>Sapajus nigritus</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	fodtb; fodsm	LC	LC	LC
FAMÍLIA CANIDAE					
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato, graxaim	fod;vscap;vscp; vsc; vsfs; ma	LC	LC	LC
<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	cachorro-vinagre	fodtb; fodsm	NT	VU	CR

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
FAMÍLIA FELIDAE					
Leopardus guttulus	gato-do-mato-pequeno		VU	VU	VU
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	VU
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)	gato-maracajá	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	NT	VU	EN
Panthera onca (Linnaeus, 1758)	onça-pintada, onça-preta	fod; vs	NT	VU	CR
Puma concolor (Linnaeus, 1771)	onça-parda, suçuarana, puma	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	NT	VU
Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)	jaguarundi	fodtb; ma fodsm; vsc; vsfs	LC	VU	VU
FAMÍLIA MUSTELIDAE					
Eira barbara (Linnaeus, 1758)	irara	fodtb; fodsm	LC	LC	LC
Galictis cuja (Molina, 1782)	furão	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	LC
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)	lontra	fodtb	NT	LC	VU
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE					
Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)	morcego	fodsm	LC	LC	LC
Artibeus cinereus (Gervais, 1856)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	DD
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	LC
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	LC
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)	morcego	fod	LC	LC	LC
Chiroderma doriae	morcego		LC	LC	LC
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)	morcego	fod	LC	LC	LC
Mimonbennettii sp.	morcego		-	-	-
Pygoderma bilabiatum (Wagner,1843)	morcego	fodsm	LC	LC	LC
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fodtb; fodsm	LC	LC	LC
Sturnira tildae	morcego		LC	LC	LC
Tonatia bidens	morcego		DD	LC	NT
FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE					
Eptesicus brasiliensis	morcego		LC	LC	LC
Histiotus velatus	morcego-orelhudo		DD	LC	LC
Lasiurus blossevilli	morcego		LC	LC	LC
Myotis nigricans	morcego		LC	LC	LC
Myotis sp.	morcego	fodsm	-	-	-
FAMÍLIA CAVIIDAE					
Cavia aperea Erxleben, 1777	preá	fodtb;	LC	LC	LC

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
FAMÍLIA CRICETIDAE					
Akodon cursor	rato-silvestre		LC	LC	LC
Akodon montensis	rato-silvestre		LC	LC	LC
Akodon spp.	rato-silvestre	fod; vs	-	-	-
Delomys dorsalis	rato-silvestre		LC	LC	DD
Delomys sublineatus	rato-silvestre		LC	LC	DD
Oligoryzomys flavescens	rato-silvestre		LC	LC	LC
Oligoryzomys nigripes	rato-silvestre		LC	LC	LC
Oryzomys spp.	rato-silvestre	fod; vs	-	-	-
Oxymycterus dasytrichus	rato-silvestre		LC	LC	Não encontrado
Oxymycterus quaestor	rato-silvestre		LC	LC	DD
Thaptomys nigrita	rato-silvestre		LC	LC	LC
FAMÍLIA ECHIMYIDAE					
Kannabateomys amblyonyx	rato-de-taquara		LC	LC	DD
FAMÍLIA EMBALLONURIDAE					
Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)	morcego	fod	LC	LC	DD
FAMÍLIA MOLOSSIDAE					
Molossus molossus (PALLAS, 1766)	morcego	fodsm	LC	LC	LC
Tadarida brasiliensis	morcego		LC	LC	LC
FAMÍLIA NOCTILIONIDAE					
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	fodtb; ma	LC	LC	NT
FAMÍLIA PROCYONIDAE					
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)	quati	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	LC
Procyon cancrivorus (F. Cuvier, 1798)	mão-pelada	fodtb; ma	LC	LC	LC
FAMÍLIA LEPORIDAE					
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)	tapiti	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	EN	DD	DD
Lepus europaeus Pallas, 1778	lebre européia	fod; vs	LC	Não encontrado	Não encontrado
FAMÍLIA SCIURIDAE					
Guerlinguetus ingrami	serelepe, caxinguelê		Não encontrado	LC	DD
Guerlinguetus aestuans (Linnaeus, 1766)	serelepe	fodtb; vsc; vsfs	LC	LC	Não encontrado
FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE					
Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766)	capivara	fodtb	LC	LC	LC
FAMÍLIA DASYPROCTIDAE					

TÁXONS	NOME POPULAR	AMBIENTES	STATUS DE CONSERVAÇÃO		
			IUCN	MMA	PARANÁ
<i>Dasyprocta azarae</i> Lichtenstein, 1823	cutia	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	DD	LC	LC
FAMÍLIA CUNICULIDAE					
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	LC	LC	VU



/SPVSBrazil
www.spvs.org.br

