

RESERVA NATURAL GUARICICA

Plano de Manejo

RPPN ÁGUAS BELAS / RPPN RIO CACHOEIRA
Antonina/PR - Dezembro 2024

ANEXO 3

Levantamento Florístico



TABELA 1. LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DA RESERVA NATURAL GUARICICA

LEGENDA

HÁBITO: **av** → arbóreo **ab** → arbustivo **hb** → herbáceo **tp** → trepador **hp** → hemiparasita **pa** → parasita

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA ACANTHACEAE		
<i>Acanthaceae</i> 1	---	hb
<i>Aphelandra liboniana</i> Linden ex Hook. f.	Bálsamo-de-duas-cores	hb
<i>Aphelandra ornata</i> (Nees) Lindau	---	hb
<i>Hygrophila brasiliensis</i> (Spreng.) Lindau	---	hb
<i>Justicia carnea</i> (Lindl.) Nicholson	Justícia-rosa, jacobina, bálsamo-cor-de-carne	hb
<i>Ruellia brevifolia</i> (Polh) C. Excurra	Pingo-de-sangue, junta-de-cobra-vermelha	hb
<i>Sanchezia ornata</i> Hook. f.	Sanquésia	hb
<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims	Amarelinha, cipó-africano	tp
FAMÍLIA ALISMATACEAE		
<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schtdl.) Mich.	---	hb
FAMÍLIA AMARANTHACEAE		
<i>Alternanthera maritima</i> (Mart.) A. St.-Hil.	---	hb
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Perna-de-saracura, bredo-d'água, carrapicho-do-brejo	hb
<i>Amaranthus viridis</i> L.	Bredo, caruru, amaranto	hb
FAMÍLIA AMARYLLIDACEAE		
<i>Hippeastrum</i> sp.	Amarílis, açucena	ep
FAMÍLIA ANACARDIACEAE		
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Aroeira-vermelha	av
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Cupiúva	av
FAMÍLIA ANNONACEAE		
<i>Annona emarginata</i> Schtdl.	Araticum, quarema	av
<i>Annona glabra</i> L.	Araticum-do-brejo, corticeira	av
<i>Annona neosericea</i> H. Rainer	Araticum-do-mato	av
<i>Annona sylvatica</i> A.St.NIHill	Araticum	av
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	Cortiça, embiú	av
<i>Rollinia sericea</i> (R.E. Fries) R.E. Fries	Araticum-alvadio	av
<i>Rollinia</i> sp1	---	av
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pindaíba, cortiça, pandauvuna	av
<i>Xylopia langsdorfianna</i> A. St.-Hil. & Tul.	Pimenteira	av
FAMÍLIA APIACEAE		
<i>Apium leptophyllum</i> (DC.) F.Muell.	aipo-chimarrão	hb
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	erva-capitão	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA APOCYNACEAE		
<i>Allamanda schottii</i> L.	Alamanda, alamanda-de-flo-pequena	ab
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll. Arg.	Guatambu	av
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	Guatambu	av
<i>Aspidosperma pyricollum</i> Müll. Arg.	Peroba-guatambu	av
<i>Aspidosperma ramiflorum</i> Müll. Arg.	Guatambu	av
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	Piquiá	av
<i>Forsteronia</i> sp	---	tp
<i>Malouetia arborea</i> Miers	---	av
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	Jasmim-cata-vento, cobrina	av
FAMÍLIA AQUIFOLIACEAE		
<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	Caúna, congonha	av
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	Caúna	av
<i>Ilex integerrima</i> Reissek.	Caúna	av
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek	Caúna	av
<i>Ilex</i> sp1	---	av
<i>Ilex theezans</i> Mart.	Caúna	av
FAMÍLIA ARACEAE		
<i>Anthurium pentaphyllum</i> Kunth	Antúrio	ep
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	Antúrio-vagabundo	ep
<i>Anthurium</i> spp.	---	ep
<i>Monstera adansonii</i> Schott	Costela-de-adão	ep
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	Banana-de-bugre, imbé	ep
<i>Philodendron corcovadense</i> Reitz	Cipó-preto	ep
<i>Philodendron cordatum</i> (Vell.) Kunth	---	ep
<i>Philodendron crassinervium</i> Lindl.	---	ep
<i>Philodendron</i> spp	---	ep
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Alface-d'água, repolho d'água	hb
FAMÍLIA ARALIACEAE		
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	Pau-de-tamanco	av
<i>Didymopanax angustissimum</i> March.	Mandioqueira	av
<i>Schefflera morototoni</i> Decne. & Planch.	Caixeta	av
<i>Oreopanax capitatum</i> Decne. & Planch.	---	ep
FAMÍLIA ARAUCARIACEAE		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Araucária	av
FAMÍLIA ARECACEAE		
<i>Arecaceae</i> 1	---	av
<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	Palmeira-brejaúva	av
<i>Attalea dubia</i> (Mart.) Burret	Palmeira-indaiá	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Bactris setosa</i> Mart.	Tucum	av
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Palmeira-juçara	av
<i>Geonoma elegans</i> Mart.	---	ab
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	Guaricanga-de-folha-larga, rabo-de-peixe	ab
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	Guaricana, guaminhova	ab
<i>Syagrus rommanzoffiana</i> Cham.	Jerivá	av
FAMÍLIA ARISTOLOCHIACEAE		
<i>Aristolochia trilobata</i> Gomez	Cipó-de-cobra, cipó-milhomens-da-praia	tp
FAMÍLIA ASCLEPIADACEAE		
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Oficial-de-sala	hb
<i>Matelea maritima</i> (Jacq.) Woodson	---	tp
FAMÍLIA ASTERACEAE		
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	Carrapicho-da-praia, carrapicho-rasteiro	hb
<i>Achyrocline satureioides</i> DC.	Losna-do-mato, macela	hb
<i>Adenostemma brasilianum</i> (Pers.) Cass.	Cravinho-do-mato	hb
<i>Aecmella</i> cf. <i>oleracea</i>	---	hb
<i>Ageratum conyzoides</i> L.	Mentrasito	hb
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	---	hb
<i>Baccharis</i> cf. <i>semiserrata</i> DC.	Vassoura	ab
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Vassoura, vassourinha	ab
<i>Baccharis myriocephala</i> A. DC.	---	hb
<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Carqueja	hb
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	Perpétua-roxa, botão-de-lapela	hb
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Buva	hb
<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	Erva-botão	hb
<i>Elephantopus mollis</i> H.B.K.	Erva-grossa, pé-de-elefante	hb
<i>Emilia sonchifolia</i> DC.	Serralhinha, falsa-serralha	hb
<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC.	Capiçoba, caruru-amargoso	hb
<i>Eupatorium betonicaeforme</i> (DC.) Baker	---	hb
<i>Eupatorium casarettoi</i> (B. L. Rob.) Steyererm.	Vassoura-branca	hb
<i>Eupatorium inulaefolium</i> Sims	---	hb
<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	Mata-pasto, cambará-falso	hb
<i>Gamochaeta</i> sp	---	hb
<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabr.	Cambará	av
<i>Mikania involucrata</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Mikania micrantha</i> Kunth	---	tp
<i>Mikania trinervis</i> Hook. & Arn.	---	tp
<i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker*	Vassourão-graúdo	av
<i>Piptocarpha</i> sp1	---	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Piptocarpha</i> sp2	---	av
<i>Solidago chilensis</i> Mey.	Arnica-brasileira, erva-lanceta	hb
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	Agrião, arnica	hb
<i>Vernonanthura discolor</i> (Spreng.) H.Rob.	Vassourão-branco	av
<i>Vernonanthura puberula</i> (Less.) H.Rob.	Cambará-branco	av
<i>Vernonia beyrichii</i> Less.	---	hb
<i>Vernonia puberula</i> Less.	Cambará-guaçu	av
<i>Vernonia quinqueflora</i> Less.	Cambarazinho	tp
<i>Vernonia scorpioides</i> (Lam.) Pers.	Cambará-ussu, erva-preá	hb
FAMÍLIA BALANOPHORACEAE		
<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	Sangue-de-dragão	pa
<i>Lophophytum leandri</i> Eichl.	Espiga-seca, batata-de-escamas	pa
FAMÍLIA BEGONIACEAE		
<i>Begonia fischeri</i> Schrank	Begônia, azedinha	hb
<i>Begonia paleata</i> Schott & A. DC.	Begônia, azedinha	hb
<i>Begonia radicans</i> Vell.	Begônia, azedinha	tp
FAMÍLIA BIGNONIACEAE		
<i>Anemopaegma chamberlaynii</i> (Sims) Bir. var. <i>tenerius</i>	Cipó-preto	tp
<i>Anemopaegma</i> sp	---	tp
<i>Bignoniaceae</i> 1	---	tp
<i>Crescentia cujete</i> L.	Coité, cuieira	av
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	Ipê-verde, ipê-mandioca	av
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos	Ipê-roxo	av
<i>Jacaranda micrantha</i> Cham.	Caroba, carobão	av
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	Carobinha	av
<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) Miers	Unha-de-gato	tp
<i>Paragonia pyramidata</i> (L.C.Rich) Bureau	Cipó	tp
<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A. Gentry	Pente-de-macaco	tp
<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker. Gawl.) Miers	Cipó-de-são-joão	tp
<i>Tabebuia cassinoides</i> DC.	Caxeta	av
<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo	Ipê-roxo	av
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G. Nicholson	Ipê-amarelo	av
<i>Tabebuia</i> sp	---	av
<i>Tabebuia</i> sp1	---	av
<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	Ipê-amarelo-do-brejo	av
FAMÍLIA BIXACEAE		
<i>Bixa orellana</i> L.	Urucum	ab
FAMÍLIA BOMBACACEAE		
<i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hil.	Paineira	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) Rob.	Embiruçu	av
<i>Spirotheca passifloroides</i> Cuatr.	Paineirinha-vermelha	ep
FAMÍLIA BORAGINACEAE		
<i>Cordia magnoliifolia</i> Cham.	Babosa-branca	
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	Louro-mole	av
<i>Cordia silvestris</i> Fresen.	Louro-branco	av
<i>Cordia verbenacea</i> DC.	Baleeira, erva-baleeira	hb
<i>Tournefortia</i> sp	---	tp
FAMÍLIA BROMELIACEAE		
<i>Aechmea gamosepala</i> Wittm.	Bromélia	ep
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	Bromélia	ep
<i>Aechmea organensis</i> Wawra	Bromélia	ep
<i>Aechmea ornata</i> Baker	Gravatá	ep
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	---	ep
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merril	Abacaxi	ep
<i>Bilbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	Gravatá, caraguatá	ep
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	Gravatá, bananinha-do-mato	hb
<i>Bromeliaceae</i> 1	---	ep
<i>Bromeliaceae</i> 2	---	ep
<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) E. Leme	Bromélia	ep
<i>Neoregelia</i> sp	Ninho-de-passarinho	ep
<i>Nidularium campoalegrense</i> Tardivo	---	ep
<i>Nidularium innocentii</i> (Mez) Smith	Bromélia	ep
<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	Bromélia	ep
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	Cravo-do-mato	ep
<i>Tillandsia spiculosa</i> Griseb.	Bromélia	ep
<i>Tillandsia stricta</i> Solander	Cravo-do-mato, gravatazinho	ep
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Cravo-do-mato	ep
<i>Tillandsia usneoides</i> L.	Barba-de-pau, barba-de-velho	ep
<i>Vriesea atra</i> Mez	---	ep
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	Bromélia	ep
<i>Vriesea drepanocarpa</i> (Baker) Mez	---	ep
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	---	ep
<i>Vriesea flammea</i> L.B.Sm.	Bromélia	ep
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez	Bromélia	ep
<i>Vriesea gigantea</i> Gaudich.	Bromélia	ep
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	Bromélia	ep
<i>Vriesea phillipoccoburgii</i> Wawra	Bromélia	ep
<i>Vriesea platynema</i> Gaudich.	Bromélia	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Vriesea procera</i> (Mart. ex Schult.) Witt.	Bromélia	ep
<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morris	Bromélia	ep
<i>Vriesea</i> spp	---	ep
<i>Vriesea vagans</i> (L. B. Sm.) L. B. Sm.	Bromélia	ep
<i>Wittrockia</i> sp	Bromélia	ep
FAMÍLIA BUDDLEJACEAE		
<i>Buddleja brasiliensis</i> Jacq. ex Spreng.	Barbasco	hb
FAMÍLIA BURSERACEAE		
<i>Protium kleinii</i> Cuatr.	Almécega, almesca	av
FAMÍLIA CACTACEAE		
<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	Rabo-de-rato	ep
<i>Lepismium houlletianum</i>	Cacto-serrote	ep
<i>Rhipsalis eliptica</i> Lindb.	Cacto-pendente	ep
<i>Rhipsalis floccosa</i> Salm.-Dyck ex Pfeiff.	---	ep
<i>Rhipsalis pachyptera</i> Pfeiff.	Comambaia	ep
<i>Rhipsalis rhombea</i> (Salm-Dyck) Pfeiff.	---	ep
<i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud.	---	ep
FAMÍLIA CAESALPINIACEAE		
<i>Bauhinia forficata</i> Link	Pata-de-vaca	av
<i>Caesalpinaceae</i> 1	---	av
<i>Schizolobium parahyba</i> Blake	Guapuruvu	av
<i>Senna cf. spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	Cássia-do-nordeste	av
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S. Irwin & Barneby	Cássia-multijuga	av
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	Fedegoso, mata-pasto	ab
<i>Senna pendula</i> (Willd.) H.S.Irwin & Barneby	Canudo-de-pito, fedegoso	ab
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	Abotinha, fedegoso	av
<i>Swartzia acutifolia</i> Vogel	Banana-de-quati	av
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	Pau-santo, pitoma preta	av
FAMÍLIA CANELLACEAE		
<i>Cinnamodendron dinisii</i> (Schwacke) Occh.	Pimenteira	av
FAMÍLIA CANNACEAE		
<i>Canna limbata</i> Roscoe	Beri-silvestre	hb
FAMÍLIA CARICACEAE		
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	Jacaratiá, mamão-do-mato	av
FAMÍLIA CECROPIACEAE		
<i>Cecropia glaziouvii</i>	Embaúba-vermelha	av
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	Embaúba	av
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	Mata-pau	av
<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.	Embaúba-do-norte	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA CELASTRACEAE		
<i>Maytenus alaternoides</i> Reissek	Cafezinho-do-mato	
<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	Cancorosa, espinheira-santa	av
<i>Maytenus schumanniana</i> Loes.	Sustento, cuinha	av
FAMÍLIA CHLORANTHACEAE		
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart.	Chá-de-bugre, cidreira	av
FAMÍLIA CHRYSOBALANACEAE		
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex A.P. DC.	Cinzeiro, ubá, uvá-de-facho	av
FAMÍLIA CLETHRACEAE		
<i>Clethra scabra</i> Pers.	Carne-de-vaca, caujuja	av
FAMÍLIA CLUSIACEAE		
<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb.	Guanando, olandi	av
<i>Clusia criuva</i> Camb.	Criúva, mangue-do-mato, mangue-bravo	av / ep
<i>Clusiaceae</i> 1	---	av
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	Bacopari	av
<i>Heimia myrtophylla</i> Cham. & Schtdl.	---	hb
FAMÍLIA COMBRETACEAE		
<i>Buchenavia kleinii</i> Exell	Guarajuva	av
<i>Laguncularia racemosa</i> Gardn.	Mangue-branco	av
<i>Terminalia</i> sp.	---	av
FAMÍLIA COMMELINACEAE		
<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	Trapoeiraba	hb
<i>Commelina robusta</i> Kunth	---	hb
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standl.	---	hb
<i>Dichorisandra thyrsoflora</i> Mik.	Cana-de-macaco, gengibre-azul	hb
<i>Tradescantia</i> sp.	---	hb
FAMÍLIA CONVULVACEAE		
<i>Convolvulaceae</i> 1	---	tp
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Burl.	Corda-de-viola, corriola, jitirana	tp
<i>Jacquemontia blanchetii</i> Moric.	---	tp
<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hall.	---	tp
FAMÍLIA COSTACEAE		
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	Cana-do-brejo, cana-de-macaco-vermelha	hb
FAMÍLIA CUNNONIACEAE		
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl	Gramimunha	av
FAMÍLIA CYPERACEAE		
<i>Becquerelia muricata</i> Nees	---	hb
<i>Bulbostylis</i> sp.	---	hb
<i>Calyptrocarya longifolia</i> Kunth	---	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl ssp. <i>jamaicense</i> (Crantz) Kük.	---	hb
<i>Cyperus laetus</i> Kunth ssp. <i>oostachyus</i> (Nees) Kük.	Junquinho	hb
<i>Cyperus diffusus</i> Vahl	Capim-agreste	hb
<i>Cyperus ferax</i> Rich.	Junco	hb
<i>Cyperus ligularis</i> L.	---	hb
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Rottb. ex Retz.	---	hb
<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	---	hb
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük.	tiririca	hb
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis montana</i> Roem. & Schult.	---	hb
<i>Eleocharis nana</i> Kunth	---	hb
<i>Eleocharis</i> sp1	---	hb
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl	---	hb
<i>Fuirena robusta</i> Kunth	---	hb
<i>Rynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	---	hb
<i>Scirpus californicus</i> (C.A.Meg.) Stend.	Totora	hb
<i>Scirpus maritimus</i> L.	---	hb
<i>Scleria latifolia</i> Sw.	Trigo-guarani	hb
<i>Scleria</i> sp1	---	hb
<i>Scleria uleana</i> Boeck. ex C.B. Clarke	---	hb
FAMÍLIA DILLENIACEAE		
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	Lixeirinha, cipó-caboclo, cipó-carijó	tp
<i>Dolioscarpus schottianus</i> Eichler	---	tp
FAMÍLIA DIOSCOREACEAE		
<i>Dioscorea</i> spp	Cará, cará-do-mato, cará-tinga	tp
FAMÍLIA EBENACEAE		
<i>Dyopis cf. inconstans</i> Jacq.	Maria-preta, fruto-de-jacu-macho	av
FAMÍLIA ELAEOCARPACEAE		
<i>Sloanea garckeana</i> K. Schum.	Laranjeira-do-mato, urucurana	av
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Laranjeira-do-mato	av
<i>Sloanea monosperma</i> Vell.	Sapopema, carrapicheira	av
FAMÍLIA ERICACEAE		
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> Meisn.	Mirtilo-brasileiro, groselha-do-brejo	ab
FAMÍLIA ERIOCAULACEAE		
<i>Eriocaulon</i> sp	---	hb
FAMÍLIA ERYTHROXYLACEAE		
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) Schult.	Fruta-de-pomba	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	Fruta-de-pomba, cocão	av
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	Cocão, baga-de-pomba	av
FAMÍLIA EUPHORBIACEAE		
<i>Actinostemon concolor</i> Müll. Arg.	Laranjeira-do-mato, laranjeira-do-banhado	av
<i>aff. Sebastiania argutidens</i> Pax & K. Hoffm.	---	av
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	Tanheiro	av
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	Tanheiro	av
<i>Aparisthium cordatum</i> Baill.	Pau-de-facho, pau-sandra	av
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	Licurana, lucurana	av
<i>Maprounea brasiliensis</i> A. St.-Hil.	Leiteiro, mata-berne	av
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	Sobragirana, figueirinha	av
<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) M. Johns.	Mata-olho	av
<i>Pausandra morisiana</i> (Casar.) Radlk.	Almecega-vermelha	av
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	Sapateiro, tamanqueira	av
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Quebra-pedra, erva-pombinha, sarandi-branco	hb
<i>Ricinus communis</i> L.	Mamona	ab
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Leiteiro, pau-de-leite	av
<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) Smith & Downs	Branquilha	av
<i>Sebastiania corniculata</i> (Vahl) Müll.Arg.	Falsa-guanxuma, guanxuma-de-chifre	hb
<i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. & Endl.	Canemuçu, embirão, peloteira	av
FAMÍLIA FABACEAE		
<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart	Angico-branco	av
<i>Andira anthelmia</i> (Vell.) JF. Macbr.	Angelim	av
<i>Canavalia bonariensis</i> Lindl.	---	tp
<i>Centrolobium microchaete</i> (Mart. ex Benth.) Lima	Araruva	av
<i>Dahlstedtia pentaphylla</i> (Taub.) Burkart	Timbozinho	ab
<i>Dalbergia brasiliensis</i> Vogel	Jacarandá	av
<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	Rabo-de-bugio	tp
<i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC.	Trevinho-do-campo, pega-pega-graúdo	hb
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	Pega-pega	hb
<i>Desmodium incanum</i> DC.	Pega-pega, mata-pasto, amor-do-campo	hb
<i>Dioclea</i> sp	Estojo-de-luneta	tp
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Timbaúva, orelha-de-macaco	av
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	Eritrina-candelabro, mulungu, corticeira-do-brejo	av
<i>Fabaceae</i> 1	---	av
<i>Lonchocarpus cultratus</i> (Vell.)	Rabo-de-bugio, embira-sapo	av
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	Pau-sangue	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Machaerium hatschbachii</i> Rudd	---	av
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelffeld	Bico-de-pato	av
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth	Bico-de-pato	av
<i>Machaerium paraguariense</i> Hassl.	Farinha-seca, pau-de-malho	av
<i>Machaerium uncinatum</i> Benth. (aff)	---	av
<i>Mucuna urens</i> DC.	Coronha, olho-de-boi, olho-de-burro, pó-de-mico	tp
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	Cabreúva	av
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harm.	Coroneira, olho-de-cabra	av
<i>Platymiscium floribundum</i> Vogel	Jacarandá-do-litoral	av
<i>Pterocarpus violaceus</i> Vogel	Pau-de-sangue, sangueiro	av
<i>Vigna longifolia</i> (Benth.) Verdc.	---	tp
<i>Vigna luteola</i> A. Gray	---	tp
<i>Zollernia latifolia</i> Smith	---	av
FAMÍLIA FLACOURTIACEAE		
<i>Casearia decandra</i> Jacq.	Guaçatunga, guaçatunga-branca	av
<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	Cambroé, guaçatunga	av
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Carvalhinho, chá-de-bugre	av
FAMÍLIA GENTIANACEAE		
<i>Macrocarpaea rubra</i> Malme	---	hb
FAMÍLIA GESNERIACEAE		
<i>Codonanthe devosiana</i> Lem.	---	ep
<i>Codonanthe gracilis</i> (Mart.) Hanst.	---	ep
<i>Nematanthus fissus</i> (Vell.) L.E. Skog.	Juquitiba	ep
<i>Nematanthus jolyanus</i> (Handro) Chautems	---	ep
<i>Nematanthus tessmannii</i> (Hoehne) Chautems	---	ep
FAMÍLIA HALORAGACEAE		
<i>Myriophyllum aquaticum</i> Camb.	---	hb
FAMÍLIA HELICONIACEAE		
<i>Heliconia velloziana</i> Emygdio	Caeté, bico-de-papagaio	hb
FAMÍLIA HIPPOCRATEACEAE		
<i>Pristimera andina</i> Miers	---	tp
FAMÍLIA HUMIRIACEAE		
<i>Humiriastrum</i> sp	---	av
<i>Vantanea compacta</i> (Schinzl.) Cuatrec.	Guaraparim	av
FAMÍLIA HYDROCHARITACEAE		
<i>Egeria densa</i> Planch.	Elódea	hb
FAMÍLIA ICACINACEAE		
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) Howard	Congonha, pau-de-corvo	av
FAMÍLIA IRIDACEAE		

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Crinum americanum</i> Ravenna	Crino-americano, açucena	hb
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	Tiririca-de-flor-amarela, falsa-tiririca, mariçó-bravo	hb
<i>Iris</i> sp	Íris	hb
<i>Neomarica candida</i>	Íris-da-praia	hb
FAMÍLIA JUNCACEAE		
<i>Juncus acutus</i> L.	Junco-agudo	hb
FAMÍLIA LACISTEMACEAE		
<i>Lacistema lucidum</i> Schnizl.	Guruguva	av
FAMÍLIA LAMIACEAE		
<i>Lamiaceae</i> 1	---	hb
<i>Ocimum micranthum</i> Willd.	Alfavaca-de-galinha	hb
<i>Ocimum selloi</i> Benth.	Alfavaca	hb
FAMÍLIA LAURACEAE		
<i>Aiouea saligna</i> Meissn.	Canela-vermelha	av
<i>Aniba firmula</i> (Nees) Mez	Canela	av
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	Canela-fogo	av
<i>Cryptocarya mandioccana</i> Meisn.*	Noz-moscada-brasileira, cajati, canela-de-porco, canela-fogo	av
<i>Cryptocarya moschata</i> Ness & Mart.	Canela-batalha, louro-precioso, canela-de-papagaio	av
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) Macbr.	Canela-toiça, canela-sebo, canela-frade	av
<i>Licaria armeniaca</i> (Nees) Kosterm	Canela	av
<i>Nectandra leucantha</i> Nees	Canela-seca, canela-branca	av
<i>Nectandra membranacea</i> Griseb.	Canela-branca	av
<i>Nectandra mollis</i> (Kunth) Nees	Canela-ferrugem, canela-amarela	av
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees	Canela-ferrugem, canela-amarela	av
<i>Nectandra puberula</i> (Schott) Nees	Canela-amarela	av
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Louro	av
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Canela-amarela, canela-amarela-de-cheiro	av
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	Canela-preta, canela-bicha	av
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart. ex Nees) Mez	Canela-sabão, canela-pimenta	av
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	Canela-amarela	av
<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	Louro-pimenta, louro-preto	av
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Howher	Sassafrás, canela-sassafrás	av
<i>Ocotea puberula</i> Nees	Canela-guaicá, canela-sebo	av
<i>Ocotea pulchella</i> Mart.	Canela-lageana, canela-do-brejo	av
<i>Ocotea</i> sp	Canela	av
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	---	av
<i>Persea alba</i> Nees	Pau-andrade	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA LECYTHIDACEAE		
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Cachimbo-de-macaco, estopeira, jequitibá	av
FAMÍLIA LENTIBULARIACEAE		
<i>Utricularia</i> sp	---	hb
<i>Utricularia subulata</i> L.	Boca-de-leão-do-banhado	hb
FAMÍLIA LOGANIACEAE		
<i>Spigelia cf dusenii</i> L. B. Smith	---	hb
<i>Strychnos fulvotomentosa</i> Gilg.	---	ab
<i>Strychnos trinervis</i> (Vell.) Mart.	Quina-cruzeiro	tp
FAMÍLIA LORANTHACEAE		
<i>Loranthaceae</i> 1	---	hp
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl) Eichl.	Erva-de-passarinho, enxerto-de-passarinho	hp
<i>Phoradendron piperoides</i> Nutt.	Erva-de-passarinho	hp
<i>Struthanthus vulgaris</i> Mart.	Erva-de-passarinho	hp
FAMÍLIA LYTHRACEAE		
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbr.	Sete-sangrias	hb
FAMÍLIA MAGNOLIACEAE		
<i>Talauma ovata</i> A. St.-Hil.	Baguaçu, pinha-do-brejo	av
FAMÍLIA MALPIGHIACEAE		
<i>Bunchosia pallescens</i> Skottsbo.	---	av
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> A. Juss.	---	tp
<i>Stigmaphyllon tomentosum</i> A. Juss.	---	tp
FAMÍLIA MALVACEAE		
aff. <i>Gaya pilosa</i> K. Schum.	---	hb
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Algodão-do-brejo, algodoeiro-da-praia	ab
<i>Malvaviscus penduliflorus</i> DC.	Malvavisco	ab
<i>Sida carpinifolia</i> L. f.	Guanxuma	hb
FAMÍLIA MARANTACEAE		
aff. <i>Stromanthe</i> sp	---	hb
<i>Goeppertia aemula</i> (Körn.) Borchs. & S. Suárez	Calateia	hb
<i>Calathea monophylla</i> (Vell.) Körn	---	hb
<i>Calathea zebrina</i> (Sims) Lindl.	Calateia-zebra, caeté	hb
<i>Ctenanthe compressa</i> (A. Dietr.) Eichl.	---	hb
<i>Maranta divaricata</i> Roscoe	---	hb
<i>Marantaceae</i> 1	---	hb
<i>Marantaceae</i> 2	---	hb
FAMÍLIA MARCGRAVIACEAE		
<i>Marcgravia polyantha</i> Delpino	Hera-das-árvores	tp
<i>Norantea brasiliensis</i> Choisy	Flor-dpapagaio	tp

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA MAYACCACEAE		
<i>Mayacca fluviatilis</i> Aubl.	Lodo, musgo-de-flor	hb
FAMÍLIA MELASTOMATACEAE		
<i>Bertolonia acuminata</i> Gardner	---	ep
<i>Bertolonia mosenii</i> Cogn.	---	ep
<i>Pleiochiton blepharodes</i> (DC.) Reginato et al.	Pixirica	ep
<i>Clidemia</i> sp	---	hb
<i>Leandra cardiophylla</i> Cogn.	Pixirica	hb
<i>Leandra cordifolia</i> (Naudin) Cogn.	Pixirica	hb
<i>Leandra dasytricha</i> (A.Gray) Cogn.	Pixirica	ab
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	Pixirica	hb
<i>Melastomataceae</i> 1	---	hb
<i>Melastomataceae</i> 2	---	hb
<i>Miconia cabucu</i> Hoehne	Pixiricão	av
<i>Miconia carthacea</i> Triana	Pixirica	av
<i>Miconia cinerascens</i> var. <i>robusta</i> Wurdack	Pixirica	av
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naud.	Jacatirão	av
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	Pixirica	ab
<i>Miconia discolor</i> DC.	---	ab
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.	Pixirica	av
<i>Miconia fasciculata</i> Gardner	Pixirica	av
<i>Miconia jucunda</i> (DC.) Triana	---	ab
<i>Miconia pusilliflora</i> (DC.) Naudin	Pixirica	av
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	Pixirica	ab
<i>Miconia</i> sp1	---	ab
<i>Miconia</i> sp2	---	ab
<i>Miconia tristis</i> ssp. <i>australis</i> Wurdack	Pixirica	av
<i>Mouriri chamissoana</i> Cogn.	Mandapuçá, guamirim-ripa	av
<i>Ossaea amygdaloides</i> (DC.) Triana	Pixirica	hb
<i>Pleiochiton</i> cf. <i>ebracteatum</i> Triana	---	ep
<i>Pterolepis glomerata</i> (Rottb.) Miq.	---	hb
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	---	hb
<i>Tibouchina pulchra</i> (Cham.) Cogn.	Quaresmeira, manacá-da-serra	av
<i>Tibouchina trichopoda</i> (DC.) Baill.	Quaresmeira, quaresmeira-do-brejo	ab
FAMÍLIA MELIACEAE		
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Canjerana, canharana	av
<i>Cedrella fissilis</i> Vell.	Cedro, cedro-rosa, cedrinho	av
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Pau-de-arco, camboatá, catiguá-morcego	av
<i>Trichilia casaretti</i> C.DC.	Catiguá	

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	Cedrinho	av
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Baga-de-morcego	av
<i>Trichilia silvatica</i> DC.	Café-do-mato	av
<i>Trichillia</i> sp	---	av
FAMÍLIA MENISPERMACEAE		
<i>Abuta selloana</i> Eichl.	Cipó-buta, butuá, baga-de-caboclo, uva-seca, parreira-brava	tp
FAMÍLIA MENYANTHACEAE		
<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	Ninfeia	hb
FAMÍLIA MIMOSACEAE		
<i>Abarema</i> sp.	Raposeira-branca, fainha-seca	ab
<i>Inga</i> cf. <i>sessilis</i> DC.	Ingá-macaco	av
<i>Inga</i> cf. <i>striata</i>	Ingá	av
<i>Inga edulis</i> Mart.	Ingá-cipó, ingá-de-metro, rabo-de-mico	av
<i>Inga edwallii</i> (Harms) T.D.Penn.	---	av
<i>Inga marginata</i> Willd.	Ingá-feijão	av
<i>Inga sellowiana</i> Benth.	Ingá-mirim, ingá-da-serra	av
<i>Mimosa bimucronata</i> (DC.) Kuntze	Maricá	av
<i>Mimosa pudica</i> L.	Dorme-dorme, planta sensível, dormideira	hb
<i>Mimosaceae</i> 1	---	hb
<i>Pseudopiptadenia warmingii</i> Benth.	Cauvi	av
FAMÍLIA MYRISTICACEAE		
<i>Virola bicuhyba</i> Schott	Bicuíba, candeia-de-caboclo, bocuva	av
FAMÍLIA MONIMIACEAE		
<i>Mollinedia argyrogyna</i> Perkins	---	av
<i>Mollinedia blumenaviana</i> Perkins	Pimenteira	ab
<i>Mollinedia elegans</i> Tul.	Pimenteira-do-mato	ab
<i>Mollinedia jorgearum</i> Peixoto	---	av
<i>Mollinedia schottiana</i> Perkins	Pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul.	Pimenteira, capixim	ab
<i>Mollinedia uleana</i> Perkins	Erva-de-santo-antonio, capixim	ab
FAMÍLIA MORACEAE		
<i>Brosimum glaucum</i> Taub.	---	av
<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	---	av
<i>Brosimum lactescens</i> (S. Moore) C.C. Berg	Muiratinga, leiteira, inharé	av
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	Mata-pau	av / ep
<i>Dorstenia carautae</i> C.C.Berg	---	hb
<i>Dorstenia hirta</i> Desv.	Caiapiá-hirto	hb
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & Bouché	Gameleira-branca	av / ep
<i>Ficus insipida</i> Willd.	Caxinguba	av / ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq.	Figueira, figueira-branca, figueira-de-folha-miúda	av / ep
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	Figueira	av / ep
<i>Ficus</i> sp1	---	av / ep
<i>Ficus</i> sp2	---	av / ep
<i>Ficus</i> sp3	---	av / ep
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	Tajuva	av
<i>Pseudolmedia hirtula</i> Kuhl.	Muiratinga, guarapirica	
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burg., Lanj. & Boer	Chincho, canxim, capirica	av
FAMÍLIA MYRSINACEAE		
<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	---	ab
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.	Capororoca	av
<i>Myrsine intermedia</i>	---	av
<i>Myrsine parvifolia</i> A. DC.	Capororoca, capororoca-do-banhado	av
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	Capororoca	av
<i>Myrsine venosa</i> A. DC.	---	av
FAMÍLIA MYRTACEAE		
<i>Calycorectes australis</i> Legrand	---	av
<i>Calycorectes sellowiana</i> Berg	---	av
<i>Calypttranthes concinna</i> DC.	Guamirim	av
<i>Calypttranthes grandifolia</i> Berg	Guamirim	av
<i>Calypttranthes lanceolata</i> Berg var. <i>catharinensis</i> Legrand	---	av
<i>Calypttranthes lucida</i> Berg var. <i>polyantha</i> (Berg) Legrand	Guamirim	av
<i>Calypttranthes strigipes</i> Berg	Guamirim-chorão	av
<i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.	Guabiroba	av
<i>Campomanesia neriiflora</i> (Berg) Nied.	---	av
<i>Campomanesia reitziana</i> D. Legrand	Guabiroba, guabiroba-morango	av
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg	Guabiroba	av
<i>Eugenia catharinensis</i> Legrand	Guamirim	av
<i>Eugenia cf candolleana</i> DC.	Cambuí-roxo, araçá-da-mata	av
<i>Eugenia cf cerasiflora</i> Miq.	---	
<i>Eugenia cf magnibracteolata</i> Mattos & D. Legrand	Cambucá-verde-de-orelha	
<i>Eugenia cf subavenia</i> Berg	---	av
<i>Eugenia cf uruguayensis</i> Cambess	Guamirim	
<i>Eugenia cf burkartiana</i> (Legrand) Legrand	Guamirim	av
<i>Eugenia cuprea</i> (O.Berg) Nied.	Murtinha	av
<i>Eugenia jambos</i> L.	---	av
<i>Eugenia malacantha</i> D.Legrand	---	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Eugenia melanogyna</i> (Legr.) Sobral	---	av
<i>Eugenia mosenii</i> (Kausel) Sobral	Cuxita, jambro	av
<i>Eugenia multicostata</i> Legrand	Araçá-piranga, pau-alazão	av
<i>Eugenia neoverrucosa</i> Sobral	---	av
<i>Eugenia obovata</i> Berg	---	av
<i>Eugenia prasina</i> Berg	Araçarana	
<i>Eugenia</i> sp 1	---	av
<i>Eugenia</i> sp. 2	---	av
<i>Eugenia</i> sp. 3	---	av
<i>Eugenia stigmatica</i> DC.	Guarimi	av
<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	Pitanga-preta	av
<i>Eugenia umbelliflora</i> Berg	Guapê, baguaçu	av
<i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely	Pitangueira-melancia, guamirim-ferrugem	av
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (Legrand & Kausel) Legrand	Guamirim, guamirim-branco	av
<i>Marlierea obscura</i> Berg	Goiaba	av
<i>Marlierea reitzii</i> Legrand	---	av
<i>Marlierea sylvatica</i> (Berg) Kiaersk.	Araçarana	av
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	Guarapuruna	av
<i>Myrceugenia miersiana</i> (Gardner) D. Legrand & Kausel	Guamirim	
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) Berg	Araçarana	av
<i>Myrceugenia reitzii</i> Legr. & Kaus.	---	av
<i>Myrcia acuminatissima</i> Berg	Batitô	av
<i>Myrcia bicarinata</i> (Berg) Legrand	---	av
<i>Myrcia brasiliensis</i> Kiaersk.	Guamirim	av
<i>Myrcia</i> cf. <i>dichrophylla</i> Legrand	---	av
<i>Myrcia</i> cf. <i>dilucida</i> G.M.Barroso	---	av
<i>Myrcia flagellaris</i> (D.Legrand) Mattos	---	
<i>Myrcia flagellaris</i> (D.Legrand) Sobral	---	av
<i>Myrcia formosiana</i> DC.	---	av
<i>Myrcia glabra</i> (Berg) Legrand	Guamirim	av
<i>Myrcia insularis</i> Gardn.	---	av
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC. var. <i>glaucescens</i> (Berg) Legrand	Pedra-ume-caá	av
<i>Myrcia palustris</i> DC.	Pitangueira-do-mato	av
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq	Goiabão	av
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq. var. <i>pubipetala</i>	Goiabão	av
<i>Myrcia pubipetala</i> var. <i>magnifolia</i> Legrand	Goiabão	av
<i>Myrcia richardiana</i> Kiaersk.	Guamirim	av
<i>Myrcia spectabilis</i> DC.	Ameixa-do-mato	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Guamirim	av
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Guamirim	av
<i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk	---	
<i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg	Cambuí-vermelho, cambucá	av
<i>Myrtaceae</i> 1	---	av
<i>Myrtaceae</i> 2	---	av
<i>Myrtaceae</i> 3	---	av
<i>Myrtaceae</i> 4	---	av
<i>Myrtaceae</i> 5	---	av
<i>Myrtaceae</i> 6	---	av
<i>Myrtaceae</i> 7	---	av
<i>Myrtaceae</i> 8	---	av
<i>Myrtaceae</i> 9	---	av
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	Landrum, cravo-do-mato, louro-do-mato	av
<i>Plinia cordifolia</i> (D.Legrand) Sobral	Guamirim	av
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	Cambucá	av
<i>Plinia trunciflora</i> (Berg) Kausel	Jaboticabeira	av
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	Araçá	av
FAMÍLIA NYCTAGINACEAE		
<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	Maria-mole	ab
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	Louro-branco, João-mole, fruta-de-pombo	av
<i>Neea pendulina</i> Heimerl	Maria-mole, maria-mole-pêndula	hb
<i>Neea schwackeana</i> Heimerl	Maria-mole	hb
<i>Nyctaginaceae</i> 1	---	hb
<i>Pisonia zapallo</i> Griseb.	Anzol-de-lontra	av
FAMÍLIA NYMPHAEACEAE		
<i>Nymphaea cf. rudgeana</i> G. Mey.	Nenúfar	hb
FAMÍLIA OCHNACEAE		
<i>Ouratea parviflora</i> (DC.) Baill.	Canela-de-veado, coração-de-bugre-vermelho, quatinga	ab
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	---	hb
<i>Sauvagesia vellosii</i> (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre	---	hb
FAMÍLIA OLACACEAE		
<i>Heisteria silviani</i> Schwacke	Casca-de-tatu	av
FAMÍLIA OLEACEAE		
<i>Tetrastylidium grandifolium</i> (Baill.) Sleum.	Mandigaú, pau-tatu	av
FAMÍLIA ONAGRACEAE		
<i>Ludwigia cf. leptocarpa</i> (Nutt.) H. Hara	---	hb
<i>Ludwigia elegans</i> (Camb.) H.Hara	Cruz-de-malta	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	Camarambaia	hb
<i>Ludwigia suffruticosa</i> (L.) H.Hara	---	hb
FAMÍLIA ORCHIDACEAE		
<i>Barbosella</i> sp	---	ep
<i>Brassavola tuberculata</i> Hook.	Orquídea	ep
<i>Campylocentrum</i> cf. <i>aromaticum</i> Barb. Rodr.	Orquídea	ep
<i>Catasetum cernuum</i> (Lindl.) Rchb.f.	Catasseto	ep
<i>Cattleya forbesii</i> Lindl.	Orquídea	ep
<i>Cleistes</i> sp.	Orquídea	hb
<i>Dichaea anchorifera</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea australis</i> Cogn.	---	ep
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	Orquídea	ep
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	Orquídea	ep
<i>Encyclia fragrans</i> (Sw.) Lemée	Orquídea	ep
<i>Encyclia vespa</i> (Vell.) Pabst	Orquídea	ep
<i>Epidendrum</i> cf. <i>pseudo-difforme</i> Schltr.	---	ep
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	Boca-de-dragão	ep
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	Orquídea	ep
<i>Epidendrum strobiliferum</i> Rchb.f.	Orquídea	ep
<i>Gomesa crispa</i> Klotzsch & Rchb. f.	Orquídea	ep
<i>Habenaria paranaensis</i> Hoehne	Orquídea	hb
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	---	ep
<i>Jacquinella globosa</i> (Jacq.) Schltr.	---	ep
<i>Lankesterella ceracifolia</i> (Barb. Rodr.) Mansf.	---	ep
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb. f.	Orquídea	ep
<i>Heterotaxis brasiliensis</i> (Brieger & Illg) F.Barros	Orquídea	ep
<i>Maxillaria</i> spp	---	ep
<i>Mesadenella esmeralda</i> (Lindl. & Rchb. f.) Pabst & Garay	---	hb
<i>Miltonia regnelli</i> Rchb. f.	Orquídea	ep
<i>Octomeria</i> cf. <i>gracilis</i> Lodd.	---	ep
<i>Octomeria fibrifera</i> Schltr.	---	ep
<i>Octomeria</i> sp1	---	ep
<i>Oncidium flexuosum</i> (Kunth) Lindl.	Chuva-de-ouro, dama-dançante	ep
<i>Orchidaceae</i> spp	---	ep
<i>Phisocyphon</i> sp	---	ep
<i>Phymatidium microphyllum</i> Barb. Rodr.	---	ep
<i>Pleurothallis</i> ("laranja")	---	ep
<i>Pleurothallis saundersiana</i> Rchb. f.	Orquídea	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Pleurothallis spp</i>	---	ep
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay	Orquídea	ep
<i>Reichenbachanthus reflexus</i> Koll., Porto & Brade	---	ep
<i>Rodriguezia bracteata</i> (Vell.) Hoehne	---	ep
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	---	ep
<i>Zygostates cornuta</i> Lindl.	---	ep
FAMÍLIA OXALIDACEAE		
<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	Trevo, azedinha	hb
FAMÍLIA PASSIFLORACEAE		
<i>Passiflora edulis</i> Sims	Maracujá	tp
<i>Passiflora sp</i>	Maracujá	tp
FAMÍLIA PHYLLANTHACEAE		
<i>Phyllanthus riedelianus</i> Müll.Arg.	---	av
FAMÍLIA PHYTOLACCACEAE		
<i>Gallesia cf. integrifolia</i> (Spreng.) Harms	Pau-de-alho, árvore-de-alho	av
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Guiné	hb
<i>Phytolacca dioica</i> L.	Umbu	av
<i>Seguiera langsdorfii</i> Moq.	Limoeiro-do-mato	av
FAMÍLIA PICRAMNIACEAE		
<i>Picramnia ramiflora</i> Planch.	Camboatã, camboitã	
FAMÍLIA PIPERACEAE		
<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	---	ep
<i>Peperomia calophylla</i> Yunck.	---	hb
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw.) DC.	---	ep
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	---	ep
<i>Peperomia obtusifolia</i> Miq.	---	ep
<i>Peperomia pereskiiifolia</i> (Jacq.) Kunth	---	ep
<i>Peperomia pseudoestrellensis</i> C.DC.	---	ep
<i>Peperomia quadrifolia</i> Kunth	---	ep
<i>Peperomia sp1</i>	---	ep
<i>Peperomia sp2</i>	---	ep
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & Mey.	Erva-de-vidro	ep
<i>Piper aduncum</i> L.	Pariparoba	ab
<i>Piper amplum</i> Kunth	---	hb
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	Pariparoba	ab
<i>Piper caldense</i> C. DC.	Paguarandi, jaborandi	hb
<i>Piper cernuum</i> Vell.	Pimenta-de-macaco	ab
<i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth	Pariparoba	hb
<i>Piper hispidum</i> C. DC.	---	hb


TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Piper lindbergii</i> DC.	---	hb
<i>Piper miquelianum</i> DC.	---	hb
<i>Piper solmsianum</i> DC.	Caapeba, jaguarandi	hb
FAMÍLIA POACEAE		
<i>Acroceras zizanioides</i> (Kunth) Dandy	---	hb
<i>Andropogon arenarius</i> Hack.	---	hb
<i>Andropogon bicornis</i> L.	Capim-rabo-de-burro, capim andaime, rabo-de-boi	hb
<i>Andropogon leucostachyus</i> H.B.K.	Capim-membeca, capim-colchão	hb
<i>Chloris retusa</i> Lag.	Capim-coqueirinho	hb
<i>Cortaderia selloana</i> (Schultes) Asch. & Graeb.	Penacho, capim-dos-pampas	hb
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	---	hb
<i>Gynerium sagittatum</i> Beauv.	Cana-brava	hb
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro ex Benth.	---	hb
<i>Imperata</i> cf. <i>contracta</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Hitch.	---	hb
<i>Imperata</i> sp	---	hb
<i>Ischaemum minus</i> Presl.	---	hb
<i>Lasiacis ligulata</i> Hitch. & Chase	Taquarinha, taquari	hb
<i>Merostachys</i> sp	Taquara	hb
<i>Olyra micrantha</i> H.B.K.	Taquari	hb
<i>Oplismenus setarius</i> (Lam.) Roem. & Schult.	---	hb
<i>Panicum laxum</i> Sw.	---	hb
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	Capim-de-anta	hb
<i>Panicum repens</i> L.	Gramma-de-ponta, grama-portuguesa	hb
<i>Dichanthelium sabulorum</i> (Lam.) Gould & C.A. Clark	---	hb
<i>Paspalum arenarium</i> Schrad.	---	hb
<i>Paspalum distichum</i> L.	---	hb
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelén	Capim-rabo-de-raposa, rabo-de-gato	hb
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel	Capim-pratuá, capim-do-mangue	hb
<i>Spartina ciliata</i> Brongn.	Capim-das-dunas	hb
<i>Spartina densiflora</i> Brongn.	---	hb
FAMÍLIA PODOCARPACEAE		
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Eichler	Pinheiro-bravo	av
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Eichler	---	av
FAMÍLIA POLYGALACEAE		
Indeterminada 1	---	hb
Indeterminada 2	---	hb
<i>Polygala</i> cf. <i>cyparissias</i> A. St.-Hil. & Moq.	Gelol-da-praia	hb

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA POLYGONACEAE		
<i>Coccoloba cf. declinata</i> Mart.	---	av
<i>Polygonum acuminatum</i> Kunth	Erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum meissnerianum</i> Cham. & Schltdl.	Erva-de-bicho	hb
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Erva-de-bicho, cataia, pimenta-d'água	hb
<i>Polygonum punctatum</i> Elliott	Erva-de-bicho	hb
FAMÍLIA PONTEDERIACEAE		
<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	Aguapé	hb
FAMÍLIA PROTEACEAE		
<i>Roupala montana</i> Aubl.	Carvalho-brasileiro, carvalho-do-cerrado	av
<i>Roupala</i> sp	---	av
FAMÍLIA QUIINACEAE		
<i>Quiina glaziovii</i> Engl.	Juruvarana, catuteiro-vermelho	av
FAMÍLIA RHIZOPHORACEAE		
<i>Rhizophora mangle</i> L.	Mangue-vermelho	av
FAMÍLIA ROSACEAE		
<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	Pessegueiro-do-mato, pessegueiro-bravo	av
<i>Rubus rosifolius</i> Sm.	Amoreira-silvestre	tp
FAMÍLIA RUBIACEAE		
<i>aff. Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Erva-de-lagarto, erva-quente, perpétua-do-mato	
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K.Schum.	---	av
<i>Alseis floribunda</i> Schott	Quina-de-são-paulo	av
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Apuruizinho-do-mato, canela-de-veado, cedro-brabo	av
<i>Bathysa meridionalis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	Macuqueiro	av
<i>Borreria verticillata</i> (L.) Mey.	Vassourinha-de-botão, botão-branco, cordão-de-frade, falsa-poaia	hb
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Cainca	tp
<i>Chomelia</i> sp.	Viuvinha	ab
<i>Cordia concolor</i> (Cham.) Kuntze	Tipo-jasmim	av
<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K.Schum.	---	hb
<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll.Arg.	Cinzeiro-preto	av
<i>Diodia radula</i> Cham. & Schltdl.	Erva-de-lagarto	hb
<i>Diodia saponariifolia</i> (Cham. & Schltdl.) K. Schum.	Poaia-do-brejo, perna-de-pomba, falsa-ipeacuanha	hb
<i>Diodia setigera</i> Spreng.	---	hb
<i>Faramea montevidensis</i> (Cham. & Schltdl.) DC.	Café-do-mato	hb
<i>Geophila repens</i> (L.) J. M. Johnston	Moranguinho-do-mato, cauá-piri, cauá-pixi	hb
<i>Hilila illustris</i> (Vell.) K. Schum.	---	ep

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Hillia parasitica</i> Jacq.	---	ab
<i>Indeterminada 1</i>	---	hb
<i>Manettia cordifolia</i> Mart.	Trepadeira-sanguínea	tp
<i>Posoqueria acutifolia</i> Mart.	Bacupari-miúdo	av
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	Baga-de-macaco	ab
<i>Psychotria barbiflora</i> DC.	---	ab
<i>Psychotria birotula</i> Smith & Downs	Maria-mole, erva-de-anta, pasto-de-anta	ab
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Carne-de-vaca, cafeeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltdl.	Cafeeiro-do-mato	ab
<i>Psychotria mapouriioides</i> DC	Erva-de-rato-branca, pitiá-mole, cafezinho	ab
<i>Psychotria nemorosa</i> Gardner	Casca-d'anta	ab
<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schltdl.) Wawra	Grandiúva-d'anta, flor-de-cera, araçá-de-macaco	ab
<i>Psychotria sp1</i>	---	ab
<i>Psychotria sp2</i>	---	ab
<i>Psychotria sp3</i>	---	ab
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomez	Poaia-branca, poaia	hb
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg.	Véu-de-noiva, buquê-de-noiva	ab
<i>Rudgea villiflora</i> K.Schum. ex Stand.	---	ab
<i>Sabicea</i>	---	tp
FAMÍLIA RUTACEAE		
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	Cutia, cutia-amarela	av
<i>Metrodorea nigra</i> A. St.-Hil.	Carrapateiro, chupa-ferro, pitaguará, vira-sarerê	av
<i>Pilocarpus pauciflorus</i> A. St.-Hil.	---	av
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mamica-de-cadela	av
FAMÍLIA SABIACEAE		
<i>Meliosma sellowi</i> Urb.	Pau-fernandes	av
FAMÍLIA SALICACEAE		
<i>Banara parviflora</i> (A.Gray) Benth.	Farinha-seca	av
<i>Banara tomentosa</i> Clos	Cambroé, guaçatunga-preta	av
FAMÍLIA SAPINDACEAE		
<i>Allophylus edulis</i> (A. St.-Hil.) Radlk.	Chal-chal, aberta-goela, baga-de-morcego, cocum, fruta-de-passarinho	av
<i>Allophylus laevigatus</i> (Turcz.) Radlk.	---	
<i>Allophylus petiolatus</i> Radlk.	Vacum-de-folha-larga, chal-chal	av
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	Camboatá-de-folha-grande	av
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Camboatá-vermelho	av
<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	Camboatá-branco	av
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	Camboatá-branco	av
<i>Matayba intermedia</i> Radlk.	Camboatá-branco	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
<i>Matayba juglandifolia</i> Radklf.	Camboatá-amarelo, pau-de-pombo, caxuá-branco	av
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	Cipó-timbó	tp
FAMÍLIA SAPOTACEAE		
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl	Aguaí, águaí-da-serra, cerejinha	av
<i>Chrysophyllum inornatum</i> Mart.	Aguaí, águaí-da-serra	av
<i>Chrysophyllum viride</i> Mart. & Eichler	Aguaí	av
Indeterminada 1	---	av
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	Maçaranduba	av
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	Pelote-de-macaco	av
<i>Pouteria durlandii</i> (Standley) Baehni ssp <i>durlandii</i>	---	av
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Pateiro, guapeva	av
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehnii	Guacá-de-leite	av
<i>Sapotaceae</i> 1	---	av
FAMÍLIA SCHROPHULARIACEAE		
<i>Scoparia dulcis</i> L.	Tupiçaba, vassourinha	hb
FAMÍLIA SMILACACEAE		
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	Salsaparrilha	tp
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	Salsaparrilha	tp
FAMÍLIA SOLANACEAE		
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltldl.	Baga-de-sabiá, marianeira, fruto-de-sabiá	ab
<i>Capsicum</i> sp	Pimenta	hb
<i>Cestrum intermedium</i> Sednt.	Coerana	ab
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Erva-moura, maria-pretinha	hb
<i>Solanum bistellatum</i> L.B. Smith & Downs	---	ab
<i>Solanum capsicoides</i> All.	Joá-vermelho	hb
<i>Solanum flaccidum</i> Vell.	Joá-cipó-cheiroso	tp
<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	Cuvitinga, fumo-bravo, fumeiro	av
<i>Solanum piluliferum</i> Dunal	---	hb
<i>Solanum pseudoquina</i> A. St.-Hil.	Coerana, tintureiro, buquê-de-noiva, quineira, guaxixim	av
<i>Solanum</i> sp 2	---	av
<i>Solanum variabile</i> Mart.	Jurubeba-velame	ab
<i>Solanum viarum</i> Dunal	Joá, mata-cavalo	ab
<i>Solanum wacketii</i> Witasek	---	ab
FAMÍLIA STERCULIACEAE		
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	Amor-do-campo	hb
FAMÍLIA STYRACACEAE		
<i>Styrax</i> sp.	---	av

TÁXONS	NOME COMUM	HÁBITO
FAMÍLIA SYMPLOCACEAE		
<i>Symplocos sp.</i>	---	av
<i>Symplocos laxiflora Benth.</i>	---	av
FAMÍLIA THEACEAE		
<i>Gordonia fruticosa Schrad.</i>	Pau-de-santa-rita, santa-rita	av
<i>Ternstroemia brasiliensis Camb.</i>	Pinta-moça	av
FAMÍLIA THYMELAEACEAE		
<i>Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling</i>	Embira-branca	av
<i>Daphnopsis sp</i>	---	ab
FAMÍLIA TYPHACEAE		
<i>Typha domingensis Kunth</i>	Taboa	hb
FAMÍLIA ULMACEAE		
<i>Celtis cf. tala Gillies ex Planch.</i>	Esporão-de-galo, taleira	tp
<i>Trema micrantha (L.) Blume</i>	Grandiúva	av
FAMÍLIA URTICACEAE		
<i>Boehmeria caudata Sw.</i>	Urtiga-mansa, assa-peixe, rami	ab
<i>Pilea cf. nummulariifolia (Sw.) Wedd.</i>	Dinheiro-em-penca	hb
<i>Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.</i>	Urtigão, urtigão-bravo	hb
<i>Urera nitida (Vellozo) P. Brack</i>	Urtigão	hb
FAMÍLIA VERBENACEAE		
<i>Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke</i>	Gaioleira	av
<i>Avicennia schaueriana Stapf & Lechmere ex Moldenke</i>	Mangue-preto	av
<i>Cytharexylum myrianthum Cham.</i>	Tucaneira	av
<i>Lantana camara L.</i>	Camará, camaradinha	ab
<i>Lantana sp</i>	---	ab
<i>Lippia alba (Mill.) N. E. Br.</i>	Cidrão, erva-cidreira, alecrim-do-mato, carmelitana, chá-de-febre	hb
<i>Petrea racemosa Nees</i>	---	tp
<i>Verbena minutiflora Briquet ex Moldenke</i>	---	hb
<i>Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke</i>	Tarumã	av
<i>Vitex polygama Cham.</i>	Tarumã, maria-preta, azeitona-do-mato, tapinhoã	av
FAMÍLIA VITACEAE		
<i>Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis ssp. verticillata</i>	Cortina-japonesa	tp
FAMÍLIA VOCHYSIACEAE		
<i>Vochysia bifalcata Warm.</i>	Guaricica, pau-amarelo, vinheiro	av
FAMÍLIA XYRIDACEAE		
<i>Xyris cf. jupicai Rich.</i>	Saguatajá, nhabutitana	hb



/SPVSBrazil
www.spvs.org.br

