



RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA

Plano de Manejo

ANEXO 4

Levantamento da Fauna



**TABELA 1. MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS DA
RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA (Baseado em Calluf, 2003)**

TÁXONS	NOME COMUM
CRUSTACEAE	
FAMÍLIA ATYIDAE	
<i>Potimirim potimirim</i> (Müller, 1881)	camarão-de-água-doce
FAMÍLIA DIOGENIDAE	
Não identificado	paguro ou ermitão
FAMÍLIA GRAPSIDAE	
<i>Goniopsis cruentata</i> (Latreille, 1803)	maria-mulata
<i>Aratus pisonii</i> (H. Milne Edwards, 1837)	caranguejo-arborícola
<i>Sesarma rectum</i> Randall, 1840	---
FAMÍLIA OCYPODIDAE	
<i>Uca</i> sp.	chama-maré
<i>Ucides cordatus</i> (Linnaeus, 1763)	caranguejo-uçá
FAMÍLIA PALAEMONIDAE	
<i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)	camarão-de-água-doce
<i>Macrobrachium olfersi</i> (Wiegmann, 1836)	camarão-de-água-doce
<i>Macrobrachium potiuna</i> (Müller, 1880)	camarão-de-água-doce
FAMÍLIA PORTUNIDAE	
<i>Callinectes</i> sp.	siri-azul
FAMÍLIA PENAEIDAE	
<i>Farfantepenaeus</i> sp.	camarão-rosa ou vermelho
<i>Litopenaeus schmitii</i> Burkenroad, 1936	camarão-branco
FAMÍLIA TRICHODACTYLIDAE	
<i>Trichodactylus fluviatilis</i> (Latreille, 1828)	caranguejo-de-água-doce
FAMÍLIA XANTHIDAE	
<i>Eurytium limosum</i> (Say, 1818)	---
MOLLUSCA	
<i>Gastropoda, Pulmonata</i>	---
<i>Mytilidae</i>	sururu
<i>Teredinidae</i>	teredo
INSECTA	
<i>Anisoptera</i>	náiades
<i>Coleoptera, Gyrinidae</i>	---
<i>Coleoptera, Hydroscaphidae</i>	besouro mãe-d'água
<i>Hemiptera, Belostomatidae</i>	barata-d'água
<i>Hemiptera, Naucoridae</i>	---
<i>Hemiptera, Notonectidae</i>	---
<i>Hemiptera, Nepidae</i>	---

<i>Megaloptera</i>	náíades
<i>Plecoptera</i>	---
<i>Zygoptera</i>	náíades

TABELA 2. ICTIOFAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
(Baseado parcialmente em Abilhôa e Duboc, 2003)

TÁXONS	NOME COMUM
FAMILIA ACHIRIDAE	
<i>Trinectes paulistanus</i> (Miranda-Ribeiro, 1915)	linguado-de-água-doce
FAMILIA ARIIDAE	
<i>Genidens genidens</i> (Cuvier, 1829)	bagre-do-natal, bagre-mandi, bagre-branco
FAMILIA ATHERINOPSIDAE	
<i>Atherinella brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	charuto, João-duto, manjuba, manjuba-verde
FAMILIA CALLICHTHYIDAE	
<i>Callichthys</i> sp.	---
<i>Corydoras barbatus</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	coridora-barbudo
FAMILIA CENTROPOMIDAE	
<i>Centropomus parallelus</i> (Poey, 1860)	robalo
FAMILIA CHARACIDAE	
<i>Astyanax lambaris</i>	---
<i>Bryconamericus pequiras</i>	
<i>Characidium canivetes</i>	
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i> (Ellis, 1911)	tetra-amarelo
<i>Hyphessobrycon griemi</i> (Hoedeman, 1957)	lambarizinho
<i>Hyphessobrycon luetkeni</i> (Boulenger, 1887)	lambarizinho
<i>Hyphessobrycon reticulatus</i> (Ellis, 1911)	lambari-prata
<i>Mimagoniates microlepis</i> (Steindachner, 1876)	---
<i>Oligosarcus hepsetus</i> (Cuvier, 1817)	dentado, saicanga
FAMILIA CICHLIDAE	
<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	cará
<i>Cichlasoma facetum</i> (Jenyns, 1842)	acará-camaleão
<i>Crenicichla</i> sp.	---
<i>Tilapia rendalli</i> (Boulenger, 1896)	tilápia
FAMILIA CRENUCHIDAE	
<i>Characidium lanei</i> (Travassos, 1967)	charutinho
FAMILIA CURIMATIDAE	
<i>Cyphocharax santacatarinae</i> (Fernández-Yépez, 1948)	peixe-duro, roncador, saguairu
FAMILIA CYNOGLOSSIDAE	
<i>Symphurus plagusia</i> (Bloch & Schneider, 1801)	língua-de-mulata

TÁXONS	NOME COMUM
FAMILIA ENGRAULIDAE	
<i>Cetengraulis edentulus</i> (Cuvier, 1829)	arenque
FAMILIA ERYTHRINIDAE	
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	traíra, taraíra, tararira
FAMILIA GERREIDAE	
<i>Diapterus rhombeus</i> (Cuvier, 1829)	caitipa-mojarra
FAMILIA GOBIIDAE	
<i>Bathygobius soporator</i> (Valenciennes, 1837)	amboré, aimoré
<i>Bathygobius</i> sp.	---
<i>Ctenogobius shufeldti</i> (Jordan & Eigenmann, 1887)	gobi-de-água-doce
<i>Ctenogobius boleosoma</i> (Gilbert & Jordan 1882)	---
FAMILIA GYMNOTIDAE	
<i>Gymnotus carapo</i> (L., 1758)	tuvira
FAMILIA HEPTAPTERIDAE	
<i>Rhamdia quelen</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	bagre, jundiá, jandiá
<i>Pimelodella</i> sp.	bagre
<i>Trichomycterus</i> sp.	bagre
FAMILIA LORICARIIDAE	
<i>Hypostomus</i> sp.	---
<i>Microlepidogaster leucofrenatus</i> (Ribeiro, 1908)	---
<i>Pseudotothyris obtusa</i> (Ribeiro, 1911)	cascudinho
<i>Pseudotothyris</i> sp.	---
<i>Rineloricaria</i> sp.	---
FAMILIA MUGILIDAE	
<i>Mugil curema</i> (Valenciennes, 1836)	parati, parati-olho-de-fogo, paratibu, solé
FAMILIA POECILIIDAE	
<i>Phalloceros</i> sp1	---
<i>Phalloceros</i> sp2	---
<i>Poecilia vivipara</i> (Bloch & Schneider, 1801)	barrigudinho, guaru
FAMILIA SCIAENIDAE	
<i>Cynoscion leiarchus</i> (Cuvier, 1830)	pescada-branca
FAMILIA SYMBRANCHIDAE	
<i>Synbranchus marmoratus</i> (Bloch, 1795)	muçum, peixe-cobra, enguia-de-água-doce
FAMILIA RIVULIDAE	
<i>Rivulus</i> sp1	---
<i>Rivulus</i> sp2	---
FAMILIA TETRAGONOPTERINAE	
<i>Deuterodon langei</i> Travassos, 1957	lambari

TABELA 3. ANUROFAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
(Baseado parcialmente em Segalla, 2003 e Marques, 2017)

LEGENDA

AMBIENTE: flo → floresta aab → áreas abertas aqu → aquático fos → fossorial ter → terrícola arb → arbórea

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
FAMÍLIA BUFONIDAE			
<i>Rhinella crucifer</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo	flo aab ter aqu	
FAMÍLIA CENTROLLENIDAE			
<i>Vitreorana uranoscopa</i> (Müller, 1924)	rã-de-vidro	flo arb aqu	vulnerável
FAMÍLIA HYLIDAE			
<i>Dendropsophus berthalutzae</i> (Bokermann, 1962)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Dendropsophus werneri</i> (Cochran, 1952)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas albomarginatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Hypsiboas semilineatus</i> (Spix, 1824)	perereca	flo arb aqu	
<i>Itapotihyla langsdorffii</i> (Duméril & Bibron, 1841)	perereca	flo arb aqu	vulnerável
<i>Phyllomedusa distincta</i> (A. Lutz in B. Lutz, 1950)	perereca-verde	flo arb aqu	
<i>Pseudis minuta</i> (Günther, 1858)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax aff. alter</i>	perereca	flo aqu	
<i>Scinax aff. Cuspidatus</i>	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Scinax argyreornatus</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca	flo arb aqu	
<i>Scinax perereca</i> Pombal (Haddad & Kasahara, 1995)	perereca	flo aab arb aqu	
<i>Trachycephalus mesophaeus</i> (Hensel, 1867)	perereca	flo arb aqu	
FAMÍLIA LEIUPERIDAE			
<i>Physalaemus spiniger</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	rãzinha	flo aab ter aqu	
<i>Physalaemus aff. Marmorata</i>	rãzinha	flo aab ter aqu	
FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE			
<i>Leptodactylus latrans</i> (=ocellatus) (Steffen, 1815)	rã	flo ter aqu	
<i>Leptodactylus notoaktites</i> (Heyer, 1978)	rã	flo ter aqu	
FAMÍLIA HYLODIDAE			
<i>Hylodes heyeri</i> (Haddad, Pombal & Bastos, 1996)	---	flo ter arb aqu	vulnerável
<i>Hylodes gr. nasus</i>	---	flo ter arb aqu	vulnerável
FAMÍLIA CRAUGASTORIDAE			
<i>Eleutherodactylus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	flo arb aqu	vulnerável
FAMÍLIA CERATOPHRYIDAE			
<i>Ceratophrys aurita</i> (Raddi, 1823)	sapo-untanha	flo ter aqu	vulnerável
FAMÍLIA CYCLORAMPHIDAE			
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo	flo ter aqu	

TÁXONS ANUROFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
FAMÍLIA MICROHYLIDAE			
<i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799)	sapinho	aab ter fos aqu	

TABELA 4. REPTILIOFAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA
(Baseado parcialmente em Morato, 2003)

LEGENDA

AMBIENTE: **fl** → florestas **re** → restingas **mn** → mangues **ab** → áreas abertas
aq (aquático) → (lt)lótico / (ln)lêntico / (ma)marinho

HÁBITOS: **fo** → fossorial **sf** → semifossorial **ter** → terrícola **aq** → aquático sensu stricto **saq** → semi-aquático
sab → semi-arborícola **ab** → arborícola

STATUS: **fr** → frequente **pfr** → pouco frequente **rr** → raro **am** → ameaçado de extinção
in → insuficientemente conhecido

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
TESTUDINES			
FAMÍLIA CHELIDAE			
<i>Hydromedusa tectifera</i> (Cope, 1869)	cágado-pescoço-de-cobra	aq (lt)	fr
FAMÍLIA CHELONIIDAE			
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)	tartaruga-cabeçuda	aq (ma)	am
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	tartaruga-verde	aq (ma)	am
CROCODYLIA			
FAMÍLIA ALLIGATORIDAE			
<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	jacaré-de-papo-amarelo	aq (ln, ma) mn	fr am
SQUAMATA – LACERTILIA			
FAMÍLIA GEKKONIDAE			
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	lagartixa-de-parede	fl re ab	fr
FAMÍLIA ANGUIDAE			
<i>Diploglossus fasciatus</i> (Gray, 1831)	lagarto-coral	fl	pfr
<i>Ophiodes fragilis</i> (Raddi, 1820)	cobra-de-vidro	fl re ab	fr
FAMÍLIA GYMNOPTHALMIDAE			
<i>Placosoma glabellum</i> (Peters, 1870)	lagarto	fl re ab	fr
FAMÍLIA TEIIDAE			
<i>Tupinambis merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839)	lagarto, teiú	fl re mn ab	fr
SQUAMATA - AMPHISBAENIA			
FAMÍLIA AMPHISBAENIDAE			
<i>Amphisbaena microcephala</i> (Wagler, 1824)	cobra-cega	fl re ab	fr
SQUAMATA - SERPENTES			

TÁXONS REPTILIOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTES	STATUS
FAMÍLIA COLUBRIDAE			
<i>Chironius exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-cipó, voadeira	fl re ab	fr
<i>Chironius laevicollis</i> (Dixon, Wiest & Cei, 1993)	cobra-cipó, voadeira	fl ab	fr
<i>Spilotes pullatus</i> (Linnaeus, 1758)	caninana	fl re	fr
FAMÍLIA DIPSADIDAE			
<i>Clelia bicolor</i> (Peracca, 1904)	muçurana	fl	rr am
<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	muçurana, bairú	fl	rr am
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	coral-falsa	fl re ab	fr
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied, 1825)	cobra-d'água	aq (lt, ln)	fr
<i>Imantodes cenchoa</i> (Linnaeus, 1758)	dormideira	fl	rr
<i>Liophis miliaris</i> (Linnaeus, 1758)	cobra-d'água	fl re mn ab aq (lt, ln, ma)	fr
<i>Oxyrhopus clathratus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	coral-falsa	fl re	fr
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i> (Ihering, 1911)	dormideira	fl re ab	fr
<i>Uromacerina ricardinii</i> (Peracca, 1897)	cobra-cipó	fl re	pfr
<i>Xenodon neuwiedi</i> (Günther, 1863)	jararaca-falsa	fl	fr
FAMÍLIA ELAPIDAE			
<i>Micrurus corallinus</i> (Merrem, 1820)	coral-verdadeira	fl re ab	fr
FAMÍLIA VIPERIDAE			
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1924)	jararaca	fl re ab	fr
<i>Bothrops jararacussu</i> (Lacerda, 1884)	jararacuçu	fl re ab	fr

TABELA 5. AVIFAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA

LEGENDA

AMBIENTE: **fpfm** → formações pioneiras de influência fluviomarinha **fpf** → formações pioneiras de influência fluvial
fod → floresta ombrófila densa primária **pa** → pastagem **ca** → capoeira (fase inicial de floresta)
cp → capoeirão (fase intermediária de floresta) **fs** → floresta secundária **aa** → áreas alteradas
aq → ambientes aquáticos

STATUS: **Am** → ameaçada de extinção **Ra** → rara **Vu** → vulnerável **Exo** → exótica **Em** → endêmica
Ic → insuficientemente conhecida e possivelmente ameaçado **M** → migratória
Bi → indicadora de integridade ambiental, para ambientes florestais
? → táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência [com base em IBAMA (2003); SICK (1997); BIRDLIFE (2000)]

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
ANSERIFORMES			
FAMÍLIA ANATIDAE			
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	ananaí	fpfm-fpf	
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	fpfm-fpf	
GALLIFORMES			
FAMÍLIA CRACIDAE			

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)	aracuã	fpfm-fod	
<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)	jacu	fod-cp-fs	Am
<i>Penelope superciliaris</i> (Temminck, 1815)	jacupemba	fod-cp-sc	
<i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	fod	Am, Bi
FAMÍLIA ODONTOPHORIDAE			
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	fod	
SULIFORMES			
FAMÍLIA FREGATIDAE			
<i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914)	fragata	aq	
FAMÍLIA SULIDAE			
<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	atobá	aq	
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	fpf-aq	
PELECANIFORMES			
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE			
<i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758)	colhereiro	fpfm-fpf	
FAMÍLIA ARDEIDAE			
<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	socó-grande	fpfm-fpf	
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	pa	
<i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	fpfm-fpf	
<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	garça-branca-grande		
<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	garça-azul	fpfm-fpf	
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	fpfm-fpf	
<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	savacu-de-coroa	fpfm-fpf	Ra
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Gmelin, 1789)	savacu	fpfm-fpf	
<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	garça-real	fpfm-fpf	
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	fpfm-fpf	
<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	socó-boi	fpfm-fpf	
<i>Ixobrychus exilis</i> (Vieillot, 1823)	socó-amarelo	fpfm-fpf	
ACCIPITRIFORMES			
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE			
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tautó-pintado	fod	
<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot, 1808)	gaviãozinho-miúdo	fod	
<i>Buteo albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-de-rabo-branco	fod	
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	gavião-caboclo	fpfm-fpf	Ra
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	fod-sc	
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	fod-ca-cp-sc-aa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	fod	
<i>Leucopternis lacernulata</i> (Temminck, 1827)	gavião-pombo-pequeno	fod	Am, Vu
<i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-grande	fod-ca-cp-fs-aa	Am
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	gavião-caramujeiro	fpfm-fpf	
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	fod	
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)	gavião-pegamacaco	fod	Ra, Bi
<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	gavião-preto	fpf-aq	
GRUIFORMES			
FAMÍLIA RALLIDAE			
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracurinha-da-mata	fpfm-fpf	
<i>Aramides cajanea</i> (Müller, 1776)	saracura-trêspotes	fpfm-fpf	
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	fpf-fod-sc	
<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	pinto-d'água	fpfm-fpf	
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	pinto-d'água-comum	fpfm-fpf	
<i>Porphyryla martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	fpfm-fpf	
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	fpfm-fpf	
<i>Rallus nigricans</i> Vieillot, 1819	saracura-sanã	fpfm-fpf	
CHARADRIIFORMES			
FAMÍLIA CHARADRIIDAE			
<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	batuíra-de-coleira	fpfm-fpf-aq	
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	fpf	
FAMÍLIA SCOLOPACIDAE			
<i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	fpfm	
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	maçarico-de-papo-vermelho	fpfm	
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	fpf	
FAMÍLIA JACANIDAE			
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	fpfm-fpf	
FAMÍLIA JACANIDAE			
<i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivota-mariavelha	aq	
<i>Larus dominicanus</i> (Lichtenstein, 1823)	gaivotão	aq	
<i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789)	trinta-réis-de-bico-amarelo	aq	
<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	trinta-réis-real	aq	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
APODIFORMES			
FAMÍLIA APODIDAE			
<i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862)	taperá-de-barriga-cinza	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	fod-ca-cp-sc-aa	
FAMÍLIA TROCHILIDAE			
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	fpf-fod-cp-fs	
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	fod-cp	
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	fpf-fod-sc-cp	
<i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783)	beija-flor-rubi	fod	
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	fod-fs-cp	
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	fod-sc-cp	
<i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818)	beija-flor-grande-da-mata	fod-sc-cp	
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	fpfm-fpf-fod-cp-fs	
CORACIIFORMES			
FAMÍLIA ALCEDINIDAE			
<i>Ceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	fpfm-fpf	
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	fpfm-fpf	
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	fpfm-fpf	
<i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-da-mata	fpfm-fpf	
FAMÍLIA MOMOTIDAE			
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	fod-sc	
GALBULIFORMES			
FAMÍLIA BUCCONIDAE			
<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)	joão-bobo	fod-sc	
PICIFORMES			
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE			
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	fod-sc	Am
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	fod-sc	
<i>Ramphastos vitellinus</i> (Lichtenstein, 1823)	tucano-de-bico-preto	fod-fs	Ra
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	fod-sc	
FAMÍLIA PICIDAE			
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1819)	pica-pau-rei	fod	Am

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-velho	fod-cp-sc	
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	pa-ca-aa	
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	fod-cp-sc	
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-da-banda-branca	fod-fs	
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	pica-pau-branco	fod-sc	
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito	fod-fs	
<i>Picus flavigula</i> (Boddaert, 1783)	pica-pau-bufador	fpfm-fpf	
<i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845)	picapauzinho	fod-cp-fs	
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	pica-pauzinho-carijó	fod-cp-sc	
FALCONIFORMES			
FAMÍLIA FALCONIDAE			
<i>Falco rufigularis</i> (Daudin, 1800)	falcão-caruê	fod	
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	fod	
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	gavião-carrapateiro	fod-ca-cp-fs-aa	
<i>Polyborus plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	fod-ca-cp-sc-aa	
PSITTACIFORMES			
FAMÍLIA PSITTACIDAE			
<i>Amazona brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-de-cara-roxa	fpfm-fod-sc	
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	fod	Am
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito	fod-ca-cp-sc-aa	
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Taczanowski, 1883)	tuim-de-asa-azul	fod-ca-cp-sc-aa	
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuíu-cuíu	fod-sc	Ra, Bi
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	fod-ca-cp-sc-aa	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1818)	tiriva-de-testa-vermelha	fod-sc	
PASSERIFORMES			
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE			
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	fod-sc	Bi
<i>Dryophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	dituí	fod	
<i>Dryophila malura</i> (Temminck, 1825)	trovoada-carijó	fod	Bi
<i>Dryophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906)	trovoada-ocre	fod	
<i>Dryophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823)	pintadinho	fod	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	fod-sc-cp	
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	fod-sc	
<i>Herpsilochmus rufomarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-ruiva	fod	Bi

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	fod	Bi
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara-preta	fod	Bi
<i>Myrmeciza squamosa</i> (Pelzeln, 1868)	formigueiro-da-grota	fod	
<i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825)	choquinha-estrelada	fod	
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétrières, 1835)	choquinha-cinzenta	fod	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	fod-sc-cp	
<i>Stymphalornis acutirostris</i> (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995)	bicudinho-do-brejo	fpfm-fpf	
<i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831)	zidedê-do-sul	fod	
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata	fod-sc-cp-ca	
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (Vieillot, 1816)	choca-de-chapéu-vermelho	fod-sc-cp	
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE			
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente-marrom	fod-fs-cp-ca	
<i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818)	chupa-dente-de-mascara	fod	
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE			
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétrières, 1835)	tapaculo-pintado	Fod	
<i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho-perereca		Bi
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE			
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1823)	arapaçu-alfange	Fod	Bi
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-pardo	fod-sc	Bi
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (Spix, 1824)	arapaçu-grande	fod-sc	Bi
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)	arapaçu-escamoso	fod-sc	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-cabeça-cinza	fod-cp-sc	
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	Fod	
<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-rajado	fod-sc	Bi
FAMÍLIA FURNARIIDAE			
<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)	limpa-folhas-de-coleira	fod	
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	fod-sc	
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	fpfm-fpf	
<i>Cichlocolaptes leucophrys</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-de-sobrancelhas	fod-sc-cp	
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853)	joão-oliváceo	cp-sc	
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	ca-cp-pa-aa	
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	bico-virado-do-sul	fod-sc	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	Fod	
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)	limpa-folha-coroado	fod-sc	
<i>Philydor lichtensteini</i> (Cabanis & Heine, 1859)	limpa-folha	fod-sc	
<i>Philydor rufus</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-canela	fod-sc	
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétrières, 1835)	vira-folhas	fod-sc	
<i>Synallaxis cinerascens</i> (Temminck, 1823)	pi-pui	fod-ca-cp-sc-aa	
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)	pichororé	fod-ca-cp-sc	
<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	joão-tenenem	fod-ca-cp	
<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	bico-virado-miudo	fod-sc	
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	fod-sc	
FAMÍLIA PIPRIDAE			
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)	tangará-dançarino	fod-fs-cp-ca	
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira-branca	fod-sc-cp	Bi
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1831)	flautim-verde	fod-sc	
FAMÍLIA OXYRUNCIDAE			
<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	bico-agudo	fod	Bi
FAMÍLIA COTINGIDAE			
<i>Carpornis cuculatus</i> (Swainson, 1821)	corocochó	fod	Bi
<i>Carpornis melanocephalus</i> (Wied, 1820)	sabiá-pimenta	fod	
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra	fod	
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga	fod	Vu
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc	Am, Bi
FAMÍLIA TYRANNIDAE			
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	tinguaçu	fod	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	cp-ca	
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu-quieto	fod-sc	
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	maria-viuvinha	fod-sc-cp-ca	
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	fod-sc-cp-ca	
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	guaracava-de-óculos	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868)	guaracava-verde	fod-sc-cp-ca	
<i>Elaenia spectabilis</i> (Pelzeln, 1868)	guaracava-grande	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	cp-ca	
<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	lavadeira-mascarada	fpf-fpfm	
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	fop-sc-cp	
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied, 1831)	tiririshinho-de-óculos	fod	
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	fod-sc	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	fod-sc-cp	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)	cabeçudo	fod-sc	
<i>Machetornis rixosus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	pa-ca-cp-sc-aa	
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	nei-nei	fod-sc-cp-ca-pa	
<i>Mionectes rufiventris</i> (Cabanis, 1846)	abre-asa-de-cabeça-cinza	fod-sc	
<i>Myiobius atricaudus</i> (Lawrence, 1863)	papa-mosca-espoleta	fod-sc	
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho-de-peito-dourado	fod-sc	
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Müller, 1776)	bem-te-vi-rajado	fod-sc-cp	
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	maria-da-copa	cp-ca	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Müller, 1776)	felipe-de-peito-riscado	pa-ca-cp	
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	fop-sc-cp	
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bem-te-vi-de-coroa-vermelha	fod-sc-cp-ca-pa	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	fod-sc-cp	
<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	piolhinho	fod	
<i>Phylloscartes kronei</i> (Willis & Oniki, 1992)	maria-da-restinga	fod	
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887)	cara-pintada	fod	
<i>Phylloscartes paulistus</i> (Ihering & Ihering, 1907)	não-pode-parar	fod	
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi-verdadeiro	fod-sc-cp-ca-pa	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)	patinho-de-garganta-branca	fod-sc	
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	ca-cp-pa-aa	
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	pa-ca-cp-sc-aa	
<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)	joão-pobre	cp	
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho-do-leste	cp	
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	maria-assobiadeira	fod-sc-cp	
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	araponguinha-de-rabo-preto	fod-sc-cp	
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	spit-spit	fod	
<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	fod	
<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-tropical	cp-ca-pa-aa	
<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	tesoura	ca-pa-aa	M
FAMÍLIA VIREONIDAE			
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	fod-fs-cp-ca-aa	
<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822)	verdinho-coroado	fod-sc-cp-ca	
<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)	juruvicara	fod-sc-cp-ca-aa	
FAMÍLIA CORVIDAE			
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul	fod-fs-cp	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE			
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa	
<i>Phaeoprogne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	andorinha-do-campo	fpf-fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-grande	fpfm-fpf-fod-sc-cp-ca-pa-aa	
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	andorinha-do-barranco	fpf-ca-pa-aa	
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE			
<i>Thryothorus longirostris</i> (Vieillot, 1819)	garrinchão-de-bico-grande	fpfm-fpf	
<i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, 1808)	corruíra	cp-ca-pa-aa	
FAMÍLIA POLIOPTILIDAE			
<i>Ramphocaenus melanurus</i> Vieillot, 1819	bico-assovelado	fod-sc-cp	Vu
FAMÍLIA PARULIDAE			
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Liechtenstein, 1830)	pula-pula-coroado	fod-sc-cp	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	fpfm-fpf-fod-cp-ca	
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita-do-sul	fod-sc-cp	
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (Wied, 1821)	pula-pula-ribeirinho	fpf-fod	
FAMÍLIA ICTERIDAE			
<i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782)	sargento	fpfm-fpf-ca	
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	fpf-fod-fs-cp	
<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	ca-pa-aa	
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	chopim-gaudério	ca-pa-aa	
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	ca-pa-aa	
FAMÍLIA THRAUPIDAE			
<i>Chlorophanes spiza</i> (Linnaeus, 1758)	saí-verde	fod-sc-cp	
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1776)	gaturamo-fifi	fod-sc-cp	
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	fod	Bi
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	fod-sc-cp	
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-da-mata	fod	Bi
<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	saíra-da-mata	fod-sc-cp	
<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)	sanhaçu-pardo	fod	
<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)	catirumbava	fod	
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viuva	fod-sc-cp	
<i>Ramphocelus bresilius</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-sangue	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	gurundi	fod-sc-cp	
<i>Tachyphonus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	tiê-galo	fod	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saira-de-lenço	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	sete-cores	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Thraupis cyanoptera</i> (Viellot, 1817)	sanhaço-asa-azul	fod	
<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)	sanhaço-do-coqueiro	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaço-cinza	fod-sc-cp-ca-aa	
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	fod-sc-cp	
SUBFAMÍLIA DACNINAE			
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	fod-sc-cp-ca	
FAMÍLIA FRINGILLIDAE			
<i>Carduelis magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo-de-cabeça-preta	pa-ca-cp-aa	
FAMÍLIA PASSERIDAE			
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal-doméstico	aa	Exo
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE			
<i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783	joão-corta-pau	fod-sc	
<i>Hydropsalis brasiliana</i> (Gmelin, 1789)	curiango-tesoura	fod-ca-pa-aa	
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1788)	tuju	fod-sc	
<i>Macropsalis creaga</i> (Bonaparte, 1850)	curiango-tesourão	fod-cp	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	curiango-comum	fod-sc	
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	tabaco-bom	pa-aa	
FAMÍLIA CATHARTIDAE			
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	fod-ca-cp-fs	
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-comum	fod-ca-cp-fs-aa	
FAMÍLIA COEREVIDAE			
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	fs-cp-ca-aa	
FAMÍLIA COLUMBIDAE			
<i>Columba plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	fod-fs	
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	ca-cp-aa	
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	juriti-piranga	fod-cp-sc	
<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu	fod-ca-cp-fs	
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	fod-sc	
FAMÍLIA CUCULIDAE			
<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	anu-preto	ca-pa-aa	
<i>Dromococcyx pavoninus</i> (Pelzelin, 1870)	peixe-frito-pavonino	cp-ca-pa	
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	ca-pa-aa	
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	fod-cp-fs	
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci-do-campo	cp-ca-pa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA EMBERIZIDAE			
<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	cp-ca-fpf	Ra, Vu
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-pimenta	fod-	Bi
<i>Saltator similis</i> (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837)	trinca-ferro-de-asa-verde	fod-fs-cp	
<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra	pa-ca-cp-aa	
<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	pa-ca-cp-aa	
<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	coleirinha	pa-ca-cp-aa	
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pichochó	fod	
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	pa-ca-cp-aa	
<i>Zonotrichia capensis</i> (Müller, 1776)	tico-tico-verdadeiro	cp-ca-pa-aa	
FAMÍLIA FORMICARIIDAE			
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1818)	tovaca-campainha	fod	Bi
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	pinto-da-mata-coroado	fod	
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu-malhado	fod	Bi
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE			
Subfamília Turdinae			
<i>Platycichla flavipes</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-preta	fod	
<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-coleira	fod-fs-cp	
<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1851)	sabiá-poca	fod-fs-cp-ca	
<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira	fod-fs-cp-ca-aa	
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE			
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	urutau	fod-fs	
TINAMIFORMES			
FAMÍLIA TINAMIDAE			
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)	jaó	fod	Am, Bi
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambu-guaçu	fod-cp-fs	Bi
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	fod	Am, Bi
STRIGIFORMES			
FAMÍLIA TYTONIDAE			
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	suindara	aa	
FAMÍLIA STRIGIDAE			
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	fod-sc	
<i>Otus atricapillus</i> (Temminck, 1822)	corujinha-sapo	fod-sc-cp	
<i>Otus choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	fod-sc-cp	
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	fod	
<i>Speotyto cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	pa-aa	

TÁXONS AVIFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
TROGONIFORMES			
FAMÍLIA TROGONIDAE			
<i>Trogon rufus</i> (Gmelin, 1758)	surucuá-de-barriga-amarela	fod-cp-sc	
<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucuá-de-peito-azul	fod-cp-fs	
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-dourado	fod-cp-sc	

TABELA 6. MASTOFAUNA DA RESERVA NATURAL PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA**LEGENDA**

AMBIENTE: **fod** → floresta ombrófila densa **fodtb** → floresta ombrófila densa de terras baixas
fodsm → floresta ombrófila densa submontana **vs** → vegetação secundária
vsfs → vegetação secundária - floresta secundária **vsc** → vegetação secundária – capoeirão
vscp → vegetação secundária – capoeira **ma** → manguezal **fpif** → formação pioneira de influência fluvial
aa → áreas alteradas **aq** → ambientes aquáticos

STATUS-LOCAL: **Co** → comum **Pc** → pouco comum **Ra** → raro

AMEAÇA: **Am** → ameaçado de extinção **Vu** → vulnerável **Qa** → quase ameaçada **Rb** → risco baixo
Di → dados insuficientes **nc** → não consta em lista oficiais
? → status a confirmar (táxon para o qual é indicada uma revisão em sua ocorrência e/ou status)

INDICAÇÃO: **In** → espécie indicadora **Ae** → animal especial

Para definição do status os autores basearam-se em observações pessoais e nas seguintes referências: Ministério do Meio Ambiente (2008) e IUCN (2008).

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
ORDEM DIDELPHIMORPHIA			
FAMÍLIA DIDELPHIDAE			
<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	cuíca-d'água	fpif	
<i>Didelphis albiventris</i> (Lund, 1840)	gambá-de-orelha-branca	fodtb; fodsm;	
<i>Didelphis aurita</i> (Wied-Neuwied, 1826)	gambá-de-orelha-preta	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Didelphis marsupialis</i> (Linnaeus, 1758)	gambá-comum	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	guaiquica	fodtb	
<i>Metachirus nudicaudatus</i> (Desmarest, 1817)	cuíca-de-quatro-olhos-marrom	fodtb; fodsm; fpif	
<i>Micoureus demerarae</i> (Thomas, 1905)	cuíca	fodtb	
<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	cuíca-de-três-listras	fodsm	
<i>Philander frenatus</i> (Olfers, 1818)	cuíca-de-quatro-olhos	fodtb; fodsm; fpif	
FAMÍLIA DASYPODIDAE			
<i>Dasytus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-galinha	fodtb-fodsm-vsc ap-vsc -vsfs	Co

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
ORDEM PILOSA			
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	fodtb-fodsm	Pc/Vu/Rb/Ae
ORDEM CHIROPTERA			
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE			
<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	morcego	fodsm	
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Artibeus fimbriatus</i> (Gray, 1838)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Artibeus obscurus</i> (Schinz, 1821)	morcego	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	morcego	fod	
<i>Chiroderma dorie</i> (Thomas, 1891)	morcego		
<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	morcego	fodtb; fodsm	
<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego-vampiro	fodtb; vsc; vsfs	
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	morcego	fod	
<i>Micronycteris</i> sp.	morcego	fodtb	
<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	morcego	fodsm	
<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	morcego	fodtb; fodsm	
FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE			
<i>Myotis</i> sp.	morcego	fodsm	
FAMÍLIA EMBALLONURIDAE			
<i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843)	morcego	fod	
FAMÍLIA MOLOSSIDAE			
<i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827)	morcego	fod	
<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	morcego	fodsm	
FAMÍLIA NOCTILIONIDAE			
<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	morcego-pescador	fodtb-ma	
ORDEM CETARTIODACTYLA			
FAMÍLIA DELPHINIDAE			
<i>Sotalia fluviatilis</i> (Gervais & Deville, 1853)	tucuxi	aq	Co
ORDEM PRIMATES			
FAMÍLIA CEBIDAE			
<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	fodtb-fodsm	Co/nc
FAMÍLIA ATELIDAE			
<i>Alouatta guariba</i> (Linnaeus, 1766)	guariba, bugio	fodsm	Pc/nc

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
ORDEM CARNIVORA			
FAMÍLIA CANIDAE			
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	cachorro-do-mato, graxaim	fod-vsc-vscp-vsc -vsfs-ma	Pc/nc
FAMÍLIA FELIDAE			
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Pc/Vu
<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato-pequeno	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	gato-maracajá	fodtb; fodsm; vsc; vsfs	Ra/Vu
<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (Geoffroy, 1803)	jaguarundi	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Ra/Vu
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	onça-parda	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Rb/Ae
FAMÍLIA MUSTELIDAE			
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	fodtb	Pc/Di/ In/Ae
<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	furão	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Pc
FAMÍLIA PROCYONIDAE			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	
<i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798)	mão-pelada	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	
ORDEM ARTIODACTYLA			
FAMÍLIA TAYASSUIDAE			
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Rb/Ae
FAMÍLIA CERVIDAE			
<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814)	veado	fodtb; fodsm; vscp; vsc; vsfs;	
<i>Mazama sp.</i>	veado n.i.	fodtb-fodsm	Co/Di
ORDEM LAGOMORPHA			
FAMÍLIA LEPORIDAE			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapiti	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Vu/ In/Ae
ORDEM RODENTIA			
FAMÍLIA SCIURIDAE			
<i>Sciurus aestuans</i> (Linnaeus, 1766)	serelepe	fodtb; vsc; vsfs	
FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE			
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	fodtb	Co
FAMÍLIA DASYPROCTIDAE			
<i>Dasyprocta azarae</i> (Lichtenstein, 1823)	cutia	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co/Di

TÁXONS MASTOFAUNA	NOME COMUM	AMBIENTE	STATUS
FAMÍLIA CUNICULIDAE			
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	fodtb-fodsm-vsc -vsfs	Co
FAMÍLIA CAVIIDAE			
<i>Cavia aperea</i> (Erxleben, 1777)	preá	fodtb	Pc/nc
FAMÍLIA CRICETIDAE			
<i>Akodon</i> sp.	rato-silvestre	fod-vs	
<i>Euryoryzomys russatus</i> (Wagner, 1848)	rato-silvestre	fod; vs	
<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	Rato-d'água	fpif-aq	
<i>Oligoryzomys</i> sp.	rato-silvestre	fod; vs	
<i>Oryzomys russatus</i>	rato-silvestre	fod-vs	



/SPVSBrasil
www.spvs.org.br

